INFORME 2024

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES

ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS EN ESPAÑA (ESTUDES), 1994-2023

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD
SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD)
Begoña BRIME, Alberto DOMÍNGUEZ, Luz LEÓN, Luisa M LÓPEZ, Eva SÁNCHEZ.
Experta externa del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)
Noelia LLORENS

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía
Rosario BALLESTA
Lara FORNOVI
Ara MILLÁN
Antonio SUÁREZ
Mónica TENA

Aragón
Carmen BARANGUAN
Marta SARTO

Asturias
José Antonio GONZÁLEZ
Luisa María GONZÁLEZ

Baleares
Rut SUÁREZ
Elena TEJERA

Canarias
Amelia María HERNÁNDEZ
Nicolás PERDOMO
Ángel RODRÍGUEZ
María del Mar VELASCO

Cantabria
María del Carmen DIEGO
María Antonia RUEDA

Castilla-La Mancha
Carlos ALONSO
Carmen DE PEDRO

Castilla y León
Mónica ELÍAS
Susana REDONDO
Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña
Natàlia ALMATÓ
Irene LANA
Pere MILLÁN
Pol ROVIRA
Dolores RUIZ

Extremadura
Catalina CUELLO DE ORO
Nerea SÁNCHEZ
José Antonio SANTOS

Galicia
Sara CERDEIRA
Mercedes LIJÓ
Silvia SUÁREZ
María TAJES
Sergio VEIGA

Madrid
Piedad HERNANDO
Nelva MATA
Andrea TANJALA

Murcia
Mónica BALLESTA
Mª Dolores CHIRLAQUE
Daniel RODRÍGUEZ

Navarra
Esther FIGUERAS
Raquel GONZÁLEZ

País Vasco
Elena ALDASORO
Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

La Rioja
Mª Gemma CESTAFE
María FERNÁNDEZ

Comunidad Valenciana
Mª Jesús MATEU
Begoña RODRIGO
Noelia SELLES
Francesc J. VERDÚ

Ceuta
Miguel Ángel MANCILLA
Ana POSTIGO
Cleopatra R'KAINA

Melilla
Luisa Fernanda HERMOSO
Natalia MARTÍNEZ

CONTACTO

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid
Teléfono: 91 822 00 00
Correo electrónico: cendocupnd@sanidad.gob.es
Internet: https://pnsd.sanidad.gob.es/

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 133-24-119-2

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado (CPAGE): https://cpage.mpr.gob.es

CITA SUGERIDA: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Informe 2024. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Madrid: Ministerio de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; 2024. 294 p.

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las comunidades autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ministerio del Interior.
- Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Departamentos de Educación de las comunidades autónomas.
- Miembros de la Red ESAR-Net: José Benito Quintana, Rosa Montes, Xiana González-Gómez, Andrea Estévez-Danta, Carlos Pernas, Rosario Rodil (Universidade de Santiago de Compostela, RIAPAd); Félix Hernández, Lubertus Bijlsma, Elisa Gracia-Marín, Claudia Simarro-Gimeno (Universitat Jaume I); Yolanda Picó, Vicente Andreu, Daniele Sadutto, Lucía Herrera-Vera (Centro de Investigación sobre Desertificación, UV-CSIC-GV); Miren López de Alda, Rocío I. Bonansea, Paula Montiel (Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, CSIC); Yolanda Valcárcel, Noelia Domínguez-Morueco, Salomé Martínez (Universidad Rey Juan Carlos); Eva Pocurull, Rosa María Marcé, Núria Fontanals (Universitat Rovira i Virgili); Iria González-Mariño (Universidad de Salamanca); Andreu Rico (Universitat de València); Lluís Corominas, Sara Rodríguez-Mozaz (Institut Català de Recerca de l'Aigua); Manuel Miró, Calos Pagan (Universitat de les Illes Balears); Ailette Prieto, Nestor Etxebarria, Olatz Zuloaga, Gorka Orive (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea); Pablo Antonio Lara-Martín, Rubén Rios-Quintero (Universidad de Cádiz); Sergio Santana-Viera (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria); Manuel Isorna (Universidade de Vigo, RIAPAd); Unax Lertxundi (Osakidetza-Servicio Vasco de Salud).
- Miembros del grupo de Análisis de Residuos de Jeringas: Rosa Montes, Carlos Pernas-Fraguela, Xiana González-Gómez, Andrea Estévez-Danta, Rosario Rodil, Ruth Olmos, Unax Lertxundi, María Gabriela Barbaglia, Amaia Garrido, Manuel Isorna, Joan Mestre, Marta Torrens y José Benito Quintana.
- Integrantes del Sistema Español de Alerta Temprana, entre los que se incluyen el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales, el Instituto de Toxicología del Ministerio de Defensa, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Centro del Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Plan Nacional sobre Sida, el Centro Nacional de Epidemiología, Instituciones Penitenciarias, responsables en las diferentes comunidades y ciudades autónomas, responsables en las diferentes entidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, responsables de los servicios de toxicología clínica del Hospital Clínic Barcelona y del Hospital Universitari Son Espases, representantes de la red ESAR-Net y Organizaciones No Gubernamentales, especialmente Energy Control, Ai Laket y Cruz Roja Española.

ÍNDICE

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2023 6

Introducción 6
Objetivos 6
Metodología 7
- Aspectos generales 7
- Ámbito de la encuesta 7
- Diseño y características de la muestra. Ponderación 7
- Trabajo de campo. Recogida de información 8
- Otros aspectos metodológicos 8

Resultados 12
- Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas 12
  - Evolución temporal 12
  - Edad media de inicio en el consumo 15
  - Edad y sexo 16
  - Comunidad/ciudad autónoma 20
- Consumo por tipo de sustancia psicoactiva 31
  - Bebidas alcohólicas 31
  - Bebidas energéticas 41
  - Tabaco 42
  - Cigarrillos electrónicos 46
  - Pipas de agua 48
  - Hipnosedantes 49
  - Analgésicos opioides 53
  - Cannabis 54
  - Cocaína 61
  - Éxtasis 63
  - Anfetaminas 65
  - Alucinógenos y setas mágicas 67
  - Heroína 68
  - Inhalables volátiles 70
  - GHB 71
  - Metanfetaminas 72
  - Esteroides anabolizantes 72
  - Sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio 73
  - Nuevas sustancias psicoactivas 74

- Policonsumo 76
- Percepciones y opiniones de la población ante el consumo de sustancias psicoactivas 78

Percepción de riesgo 78

Percepción de disponibilidad 80

Vías de información sobre sustancias psicoactivas 82

Valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas 83

- Entorno de ocio: actividades, salidad nocturnas (frecuencia y horario) y dinero disponible 85

Actividades de ocio 85

Actividades de ocio y consumo de sustancias psicoactivas 86

Salidas nocturnas, frecuencia 87

Salidas nocturnas, frecuencia y consumo de sustancias psicoactivas 87

Salidas nocturnas, horario de regreso a casa 90

Salidas nocturnas, horario de regreso a casa y consumo de sustancias psicoactivas 90

Dinero disponible para gastos personales 92

Situación económica familiar 92

Consecuencias no deseables del consumo de drogas 93

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2023*

Introducción

Durante 2023 se ha realizado una nueva edición de la encuesta ESTUDES, que se enmarca en la serie de encuestas que vienen realizándose en España de forma bienal desde 1994, y que tienen como objetivo conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas y otras adicciones entre los estudiantes de 14 a 18 años que cursan Enseñanzas Secundarias.

Su financiación y promoción corresponden a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) y cuenta con la colaboración de las comunidades autónomas (Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Educación) y del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La metodología es similar a la utilizada en otros países de la Unión Europea y Estados Unidos, lo que permite realizar comparaciones internacionales.

Objetivos

ESTUDES tiene por objetivo recabar información de valor para diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir el consumo de drogas y otras adicciones y los problemas derivados, que se orientan principalmente al medio familiar y/o escolar. Esta información complementa a la que se consigue a través de otras encuestas e indicadores epidemiológicos.

A partir de este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y de otras adicciones.
- Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- Conocer algunos patrones de consumo relevantes.
- Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo y otras adicciones.
- Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones.

* En muchos gráficos y tablas de este capítulo se recogen solamente algunos años (por lo general, a partir del año 2000); la serie completa se puede consultar en https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf

Metodología

Aspectos generales

Nombre: ESTUDES. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España.

Descripción de la encuesta: Encuesta en estudiantes (14-18 años), realizada en centros educativos.

Periodicidad: ESTUDES se realiza cada dos años desde 1994.

Responsable de la encuesta: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA). Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). Ministerio de Sanidad.

Ámbito de la encuesta

Ámbito geográfico: La encuesta se realiza en todo el ámbito nacional.

El diseño de la muestra permite una aceptable precisión en cuanto a los resultados sobre las prevalencias de consumo de drogas a nivel nacional pero no a nivel de comunidad autónoma. Así, a excepción del alcohol, el tabaco y el cannabis, las prevalencias de consumo que se obtienen en cada comunidad autónoma presentan intervalos de confianza amplios, especialmente aquellas de menor población, de manera que este tipo de resultados quedan afectados por el azar y pueden aparecer notables variaciones en cada año de medición.

Ámbito poblacional: El universo está compuesto por estudiantes de 14 a 18 años que cursan Enseñanzas Secundarias en España (3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional) en España.

Ámbito temporal: El periodo de recogida de información ha sido del 5 de febrero al 28 de mayo de 2023.

Diseño y características de la muestra. Ponderación

Marco muestral: El marco muestral utilizado para seleccionar la muestra fue la población de estudiantes matriculada en centros educativos con 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 1º y 2º de Bachillerato, 1º y 2º de Ciclos de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional. Quedan excluidos de este marco determinados colectivos como son, los alumnos de 14 años que cursan Educación Primaria, aquellos de 18 años que están matriculados en estudios universitarios, los estudiantes de 14 a 18 años que no asistieron a clase el día y hora en el que se cumplimentó la encuesta (ausentes), los estudiantes de Enseñanzas de Régimen General incluidos en Programas de Garantía Social y a distancia, y los estudiantes de Enseñanzas de Régimen Nocturno y de Enseñanzas de Régimen Especial. El sesgo derivado del absentismo y de la proporción de jóvenes de 14 a 18 años que queda fuera del marco, presumiblemente ha permanecido sin cambios relevantes a lo largo de la serie y, por tanto, cabe esperar que su repercusión en los resultados sobre consumo de drogas y otras adicciones en España tenga un carácter residual.

Procedimiento de muestreo: Se ha realizado un muestreo por conglomerados bietápico, en el que, en primera instancia, se han seleccionado aleatoriamente centros educativos (unidades de primera etapa) y en segundo lugar aulas (unidades de segunda etapa), proporcionando el cuestionario a todos los alumnos presentes en las mismas.

Para la selección de los centros educativos, se han utilizado listados del Registro de Centros Docentes del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se estratificó el marco muestral por las comunidades y ciudades autónomas que integran el territorio español (obteniendo un total de 19 estratos), por la titularidad jurídica de los centros (dos estratos: centros educativos públicos y privados) y el tipo de enseñanza que imparten [cuatro estratos: ESO (3º o 4º), Bachillerato, CFPB y CFGM de FP]. Todos los centros tenían la misma probabilidad de participar en la encuesta dentro de cada estrato, independientemente de su tamaño. Del mismo modo, en la selección final de las aulas de los centros escogidos, todas ellas contaban con la misma probabilidad de ser seleccionadas, eligiéndose por centro dos aulas de distinto curso del mismo estrato de enseñanza para la participación en la encuesta.

Tamaño de la muestra: Se obtienen resultados de 1.002 rutas realizadas en 888 centros educativos y en 1.992 aulas, con una muestra valida final de 42.208 alumnos.

Ampliación de la muestra: En esta edición de ESTUDES las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla ampliaron su muestra correspondiente de centros con el objetivo de obtener información específica para su territorio con un margen de error estadístico menor.

Error muestral: El error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0,5 es del ±0,6% para los estudiantes de 14 a 18 años.

Trabajo de campo. Recogida de la información

Método de recogida: Una vez establecido un primer contacto y concertada una cita con el centro seleccionado, el trabajador de campo acude al mismo y explica a su responsable la metodología de la encuesta y el proceso del trabajo. Una vez seleccionadas las aulas y pactada la fecha de encuestación, se persona de nuevo en el centro y procede a aplicar el cuestionario.

Cuestionario: Se ha empleado un cuestionario estandarizado y anónimo, similar al de otras encuestas realizadas en Europa y Estados Unidos, lo que permite realizar comparaciones.

El cuestionario es de tipo "auto-administrado" cumplimentándose por escrito (papel y lápiz) por todos los estudiantes de las aulas seleccionadas durante una clase normal (45-60 minutos).

El cuestionario está disponible tanto en castellano como en el resto de las lenguas cooficiales: catalán, vasco, gallego y valenciano; con el objetivo de atender a las peculiaridades lingüísticas de cada comunidad autónoma.

El cuestionario contempla un módulo de preguntas básico, incluido en todos los años previos, un módulo sobre "consumo problemático de cannabis", incluido por primera vez en 2006, un módulo sobre "nuevas sustancias psicoactivas", que se introdujo por primera vez en 2010, un módulo sobre "uso de internet y otras conductas relacionadas" introducido por primera vez en 2014, un módulo sobre "juego con dinero" (desde 2014) y un módulo sobre "sustancias estimulantes que mejoran el rendimiento en el estudio" introducido por primera vez en 2016, un módulo sobre "videojuegos" introducido por primera vez en 2019 y, finalmente, en 2023 por primera vez se ha introducido un módulo sobre "pornografía".

Tasa de respuesta: La tasa de respuesta de los centros fue de 86,7% (en la anterior edición fue de 88,7%); es decir, un 86,7% de los centros seleccionados inicialmente participaron en la encuesta, además sólo el 0,8% de los centros seleccionados fueron sustituidos principalmente por una presencia elevada de alumnos mayores de 18 años. La tasa de respuesta de ESTUDES 2023 entre los alumnos de 14 a 18 años fue del 99,7% siendo superior al de la edición anterior (97,6%).

No se han registrado incidencias relevantes en cuanto a la colaboración por parte de directores, jefes de estudio, docentes o alumnos.

Otros aspectos metodológicos

La ponderación para el análisis de resultados se ha realizado en función de la comunidad autónoma (19 estratos), titularidad del centro (público, privado) y tipo de estudios (ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional), para ajustar la proporcionalidad de la muestra con respecto al universo.

La información sobre la distribución del universo según las tres variables de ponderación se obtuvo del Ministerio de Educación y Formación Profesional en base a los datos de alumnos de 14 a 18 años disponibles en el momento de la elaboración del análisis (curso 2020-2021). Esta información sobre el universo se utilizó igualmente para crear el factor de expansión de la muestra, que permite obtener los resultados a nivel de unidades poblacionales (miles de personas). De esta manera se establece la equivalencia de cada caso muestral con la población a la que representa.

Los cálculos se realizan excluyendo del numerador y del denominador los sujetos con valores desconocidos.

En la tabla 1.2.1 se muestra la distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias en España, según comunidad autónoma de residencia, titularidad jurídica del centro educativo y tipo de estudios (2000-2023).

Tabla 1.2.1.

Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según comunidad/ciudad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
Andalucía	402.840	361.512	363.862	326.571	304.858	350.592	345.073	296.955	307.453	321.268	333.606	354.250
Aragón	49.597	45.599	44.849	40.860	38.581	44.414	45.224	39.471	40.463	43.406	44.782	48.444
Asturias	48.271	42.232	39.752	33.888	28.534	32.598	32.381	26.746	27.234	28.070	28.288	30.844
Baleares	34.923	34.408	34.804	31.333	30.164	33.985	35.788	31.203	32.753	36.250	37.995	41.852
Canarias	96.577	87.248	85.592	74.244	68.929	78.902	81.402	67.994	73.074	78.018	79.980	82.585
Cantabria	26.253	23.666	22.473	19.609	17.583	20.366	19.980	16.536	17.541	18.764	18.566	21.516
Castilla y León	117.058	105.092	102.177	89.776	78.471	88.990	87.789	73.070	74.887	76.182	76.041	78.810
C.-La Mancha	79.729	77.727	78.397	73.297	69.538	79.848	81.315	69.444	71.507	73.671	74.138	79.078
Cataluña	262.519	248.490	248.973	236.139	234.395	264.590	275.946	250.522	249.005	271.365	290.928	319.302
C. Valenciana	190.873	178.801	177.602	160.648	154.174	176.955	180.461	153.623	161.202	173.196	181.853	189.772
Extremadura	54.160	51.426	50.791	46.757	41.203	45.254	44.111	38.292	38.332	39.436	39.061	41.368
Galicia	134.929	113.916	112.125	94.564	82.464	95.485	87.948	73.481	75.578	79.623	80.808	90.621
Madrid	251.754	229.324	231.045	207.926	191.834	224.210	227.068	199.999	211.462	230.278	246.595	262.151
Murcia	60.005	55.246	56.305	51.755	49.721	57.769	59.440	51.322	54.473	58.481	59.696	63.046
Navarra	22.174	21.103	20.626	19.640	19.061	22.096	22.524	21.251	21.858	23.789	23.764	27.158
País Vasco	90.058	82.048	78.790	67.592	63.000	72.145	72.410	64.174	68.202	75.229	78.859	83.497
La Rioja	11.940	10.928	10.723	9.755	9.080	10.567	10.976	9.628	10.262	11.006	10.778	12.320
Ceuta	3.611	3.303	3.433	2.797	2.680	3.224	3.209	2.715	3.230	3.616	3.321	4.127
Melilla	3.197	3.244	2.970	2.791	2.890	6.099	3.776	3.105	3.421	3.778	3.407	3.510
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO												
Pública	1.362.588	1.225.988	1.241.521	1.093.906	1.004.590	1.154.668	1.189.700	1.014.070	1.056.289	1.123.968	1.169.785	1.255.359
Privada	577.880	549.325	5.237.68	496.036	482.570	553.421	527.121	475.461	485.648	521.458	542.681	578.892
TIPO DE ESTUDIOS												
ESO	953.021	935.678	937.280	891.860	845.306	828.331	826.153	826.260	850.831	867.852	921.993	965.717
Bachillerato	724.972	614.796	600.389	576.960	520.541	608.428	594.090	550.619	560.404	582.505	583.240	624.193
FP	262.475	224.839	227.620	121.122	121.313	271.330	296.578	112.652	130.702	195.069	207.233	244.341
TOTAL	1.940.468	1.775.313	1.765.289	1.589.942	1.487.160	1.708.089	1.716.821	1.489.531	1.541.937	1.645.426	1.712.466	1.834.251

FUENTES: Ministerio de Educación y Formación Profesional y OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.2.

Distribución de los estudiantes de 14 a 18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
COMUNIDAD AUTÓNOMA												
Andalucía	2.372	2.552	2.464	2.750	6.143	3724	2.378	4.636	2.970	2.884	2.659	4.021
Aragón	671	2.185	1.757	1.764	785	1377	2.464	2.710	2.781	2.590	952	2.251
Asturias	661	744	584	1.737	627	1155	2.024	1.890	1.898	2.039	789	2.015
Baleares	602	1.762	1.795	622	599	1203	806	859	913	840	864	2.207
Canarias	739	960	835	2.079	1.398	1815	1.155	3.592	3.214	1.328	1.150	2.488
Cantabria	1.244	1.169	1.478	1.376	352	906	1.923	1.885	1.859	1.960	609	1.865
Castilla y León	919	1.140	983	1.107	1.697	1865	1.151	2.284	1.220	2.538	1.156	2.574
C.-La Mancha	1.749	2.501	860	984	1.359	1818	1.721	1.941	2.133	2.036	1.195	2.110
Cataluña	1.552	1.885	2.831	2.177	4.628	3415	2.353	2.510	2.617	2.640	2.493	2.675
C. Valenciana	2.287	1.685	1.362	1.657	3.119	2.727	1.696	3.260	3.502	3.628	1.891	3.636
Extremadura	443	796	1.693	777	807	1.370	860	905	817	907	848	847
Galicia	1.170	2.108	1.245	2.244	1.799	1.945	2.022	2.102	2.089	2.026	1.244	2.185
Madrid	2.929	3.308	3.033	3.055	3.904	3.056	3.250	4.404	4.321	4.172	2.343	3.901
Murcia	727	1.394	1.468	1.601	998	1.551	1.054	1.085	1.259	2.240	1.131	2.100
Navarra	627	530	600	570	361	960	605	662	773	2.353	824	2.151
País Vasco	852	806	990	884	1.316	1.726	1.096	1.164	1.286	1.314	1.226	1.184
La Rioja	462	457	975	525	190	647	477	507	1.076	1.033	451	1.586
Ceuta	323	130	140	289	46	325	232	224	319	668	251	682
Melilla	121	464	428	256	57	382	236	866	322	814	245	1.730
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO												
Pública	10.421	14.445	14.889	13.050	20.720	22.081	18.848	25.976	24.383	25.402	14.824	28.748
Privada	10.029	12.131	10.632	13.404	9.463	9.886	8.655	11.510	10.986	12.608	7.497	13.460
TIPO DE ESTUDIOS												
ESO	13.664	14.400	14.415	15.983	15.671	17.816	14.953	21.278	20.219	21.224	12.636	23.157
Bachillerato	5.869	10.733	9.468	8.468	10.348	11.683	10.384	14.624	13.496	13.858	7.994	15.123
FP	917	1.443	1.638	2.003	4.164	2.468	2.166	1.584	1.654	2.928	1.691	3.928
TOTAL	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486	35.369	38.010	22.321	42.208

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.3.

Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia (números absolutos). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
CENTROS												
Andalucía	54	60	64	70	77	62	63	110	68	68	61	90
Aragón	17	35	32	33	49	63	68	69	69	66	22	54
Asturias	17	18	16	29	48	63	59	55	53	51	18	46
Baleares	15	32	32	15	41	77	22	20	23	21	21	48
Canarias	21	23	22	33	57	30	32	92	80	33	30	56
Cantabria	28	29	28	28	39	58	58	50	49	51	15	42
Castilla y León	25	30	27	32	35	29	33	61	32	65	29	57
C.-La Mancha	44	58	22	25	31	29	43	52	53	51	30	49
Cataluña	37	43	70	53	56	53	55	58	59	59	55	57
C. Valenciana	56	37	35	40	46	66	48	78	86	89	45	76
Extremadura	10	19	31	19	25	22	27	27	23	22	19	20
Galicia	25	36	30	39	62	65	60	57	53	52	30	48
Madrid	66	75	71	71	85	81	81	98	96	95	52	79
Murcia	17	38	25	25	48	25	27	25	29	52	26	49
Navarra	15	14	14	13	16	15	17	17	18	52	17	43
País Vasco	21	22	26	28	30	28	30	32	33	32	29	28
La Rioja	12	12	17	12	25	37	12	11	25	23	11	28
Ceuta	5	3	5	7	7	6	6	6	7	17	6	8
Melilla	3	7	6	5	7	48	6	23	7	18	7	10
Total	488	591	573	577	784	857	747	941	863	917	523	888
AULAS												
Andalucía	108	119	128	139	154	125	126	218	136	127	160	182
Aragón	31	101	95	92	98	128	136	138	137	127	52	112
Asturias	30	35	32	84	96	125	125	106	106	99	52	101
Baleares	24	84	93	30	82	153	43	40	46	40	52	105
Canarias	41	46	44	98	114	60	66	182	160	59	74	126
Cantabria	48	58	84	81	78	116	117	98	98	98	30	96
Castilla y León	47	58	54	64	70	60	71	121	64	126	68	126
C.-La Mancha	69	116	44	50	62	63	96	104	106	100	63	100
Cataluña	74	87	140	103	112	111	115	116	118	117	113	117
C. Valenciana	90	72	70	80	92	136	92	154	172	169	118	162
Extremadura	19	37	92	38	50	45	57	50	46	44	47	42
Galicia	43	102	60	116	124	129	120	114	104	101	66	104
Madrid	119	144	142	142	170	160	166	196	190	185	168	168
Murcia	29	72	74	75	96	51	55	50	58	104	85	104
Navarra	22	26	28	26	32	32	30	32	36	102	35	100
País Vasco	40	44	51	56	60	56	60	60	66	61	58	60
La Rioja	20	22	50	24	50	74	24	22	50	44	26	74
Ceuta	15	6	10	14	14	12	12	12	19	32	23	35
Melilla	6	22	24	10	14	94	12	45	14	34	21	78
Total	875	1.251	1.315	1.322	1.568	1.730	1.523	1.858	1.726	1.769	1.311	1.992

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.4.

Error muestral de la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de p=q=0,5) España, 2023.

	Número de puntos muestrales*			Número de alumnos			Error muestral****
	DGPNSD**	Ampliación***	Tamaño final	DGPNSD**	Ampliación***	Tamaño final	(±)
Andalucía	62	30	92	2.658	1.363	4.021	1,6%
Aragón	23	33	56	974	1.277	2.251	2,1%
Asturias	18	33	51	724	1.291	2.015	2,2%
Baleares	21	32	53	886	1.321	2.207	2,1%
Canarias	30	33	63	1.160	1.328	2.488	2,0%
Cantabria	15	33	48	568	1.297	1.865	2,2%
Castilla y León	29	35	64	1.209	1.365	2.574	1,9%
Castilla-La Mancha	30	21	51	1.209	901	2.110	2,1%
Cataluña	59		59	2.675	0	2.675	1,9%
C. Valenciana	46	35	81	2.146	1.490	3.636	1,6%
Extremadura	21		21	847	0	847	3,4%
Galicia	32	20	52	1.325	860	2.185	2,1%
Madrid	53	32	85	2.380	1.521	3.901	1,6%
Murcia	26	26	52	1.096	1.004	2.100	2,1%
Navarra	17	33	50	724	1.427	2.151	2,1%
País Vasco	30		30	1.184	0	1.184	2,9%
La Rioja	12	25	37	554	1.032	1.586	2,3%
Ceuta	7	11	18	280	402	682	3,5%
Melilla	7	32	39	286	1.444	1.730	1,7%
Total España	538	464	1.002	22.885	19.323	42.208	0,6%

* El punto muestral es el centro educativo para la enseñanza para la que ha sido seleccionada. De esta manera, es posible que un mismo centro educativo haya podido ser seleccionado para dos enseñanzas diferentes y por ello tenga asignado 2 o más puntos muestrales.

** Muestra financiada por la DGPNSD.

*** Muestra financiada por las CCAA (colegios ampliados en la muestra).

**** Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0,5.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Resultados

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas

Evolución temporal

El **alcohol** se sitúa como la sustancia psicoactiva más consumida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, ya que 3 de cada 4 reconoce su consumo alguna vez en su vida, lo que supone 2 puntos porcentuales más respecto al dato de 2021. Este incremento también se amplía tanto entre los alumnos que reconocen haberlo consumido en los últimos 12 meses, cuyo dato se incrementa en 3,1 puntos porcentuales llegando a un 73,6%, como entre los alumnos que reconocen la prevalencia de consumo en los últimos 30 días, cuyo dato se incrementa también 3 puntos porcentuales llegando a un 56,6%.

El **tabaco** se mantiene como la segunda sustancia psicoactiva con mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes. Sin embargo, cabe destacar que se trata del dato más bajo dentro de la serie histórica, siendo 4,8 puntos porcentuales menos que en 2021 y menos de la mitad que hace 25 años. Esta tendencia decreciente se observa también en los datos recogidos respecto al consumo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días.

En tercera posición nos encontramos el consumo de **cannabis**. El 26,9% de los jóvenes admiten haber consumido cannabis en alguna ocasión, mientras que aquellos que consumieron en el último año suponen el 21,8% y en los últimos 30 días, el 15,6% de los alumnos. Lo que significa el no retorno a los valores obtenidos en prepandemia y una continuación de la tendencia negativa iniciada en la medición del 2021.

Los **hipnosedantes** (tranquilizantes/somníferos) con o sin receta consolidan su tendencia y se mantienen como la cuarta droga de mayor prevalencia, observándose que el 19,6% de los estudiantes las han tomado alguna vez en la vida. Si bien en ámbitos de tiempo más cercanos (últimos 12 meses y últimos 30 días) se puede observar un aumento en su consumo.

Al igual que en el caso de los hipnosedantes, el consumo de **éxtasis** se estanca y se mantiene en 3,1%, aunque sí se observa un incremento dentro de los consumidores más habituales. Así, el 2,2% admite haberlo consumido en el último año y el 0,9% en el último mes.

Por su parte, el consumo de **cocaína** (polvo y/o base) vuelve a los valores de 2019. Y en el caso del consumo reciente (últimos 30 días), el dato vuelve a 2016 con un total de 1% de consumo.

Tabla 1.2.5.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2000-2023.

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida												
	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alcohol	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9	73,9	75,9
Tabaco	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5	41,3	38,2	33,4
Cannabis	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1	31,1	33,0	28,6	26,9
Hipnosedantes*	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9	18,4	19,6	19,6
Hipnosedantes**	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0	8,6	10,3	9,7
Cocaína polvo y/o base	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2	2,9	2,7	2,9
Éxtasis	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3	2,6	3,1	3,1
Alucinógenos	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6	1,9	1,7	1,9
Inhalables volátiles	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0	1,7	1,8	2,8
Setas mágicas	–	–	–	–	–	2,1	2,2	1,3	1,4	1,7	1,3	1,5
Metanfetamina	–	–	–	–	–	0,8	0,9	0,8	1,4	1,6	1,5	1,5
Anfetaminas	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7	1,5	1,5	1,7
Heroína	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8	0,7	0,5	0,7
GHB	–	–	–	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6	0,6	0,4	0,7
Est. anabolizantes	–	–	–	–	–	–	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6

Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses												
	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alcohol	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9	70,5	73,6
Tabaco	–	–	–	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4	34,7	35,0	30,7	27,7
Cannabis	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3	27,5	22,2	21,8
Hipnosedantes*	–	–	–	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8	11,6	12,5	13,6	14,8
Hipnosedantes**	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4	6,1	7,2	7,4
Cocaína polvo y/o base	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5	2,4	2,1	2,3
Éxtasis	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6	1,9	1,8	2,2
Alucinógenos	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0	1,4	1,0	1,3
Inhalables volátiles	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6	1,0	0,9	2,1
Setas mágicas	–	–	–	–	–	1,6	1,4	0,8	0,9	1,1	0,9	1,1
Metanfetamina	–	–	–	–	–	0,6	0,7	0,5	1,0	1,2	1,1	1,1
Anfetaminas	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2	1,1	0,8	1,3
Heroína	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5
GHB	–	–	–	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4	0,3	0,5
Est. anabolizantes	–	–	–	–	–	–	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días												
	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alcohol	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5	53,6	56,6
Tabaco	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3	26,7	23,9	21,0
Cannabis	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3	19,3	14,9	15,6
Hipnosedantes*	–	–	–	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2	5,9	6,4	7,5	8,2
Hipnosedantes**	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6	2,9	3,6	3,8
Cocaína polvo y/o base	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0	0,9	0,6	1,0
Éxtasis	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6	0,7	0,6	0,9
Alucinógenos	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4	0,5	0,3	0,5
Inhalables volátiles	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5	0,4	1,0
Setas mágicas	–	–	–	–	–	0,7	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5
Metanfetamina	–	–	–	–	–	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,6
Anfetaminas	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,2	0,7
Heroína	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4
GHB	–	–	–	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3
Est. anabolizantes	–	–	–	–	–	–	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4
Prevalencia de consumo diario en los últimos 30 días												
	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alcohol	–	–	–	1,9	2,9	6,0	2,7	1,7	1,6	1,0	1,1	1,5
Tabaco	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8	9,8	9,0	7,5
Cannabis	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7	1,8	2,0	2,3	1,6	1,3
Hipnosedantes*	–	–	–	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8	2,7	3,0	3,7	4,9
Hipnosedantes**	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	1,1	1,2	1,4	2,1

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Edad media de inicio en el consumo

Con respecto a las sustancias psicoactivas más consumidas (alcohol y tabaco), las edades medias de inicio en su consumo son 13,9 y 14,1 años respectivamente.

El primer consumo de **alcohol** entre los estudiantes baja una décima a los 13,9 años. Por su parte, el consumo semanal de alcohol comienza de media a los 15 años, observándose un descenso con respecto a 2021. Centrando el análisis en el **tabaco**, a pesar de que la edad media de inicio del consumo se mantiene en 14,1 años, la edad de inicio entre aquellos que consumen a diario tabaco baja una décima de 14,7 años en 2021 a 14,6 años en 2023.

En cuanto a los **hipnosedantes** (ya sean con o sin receta), la edad media de inicio en el consumo mantiene una gran estabilidad, ya que se mantiene en los 14,1 años. El inicio en el consumo de **cannabis** comienza a los 14,9 años, consolidando la tendencia registrada desde el 2019.

Tabla 1.2.6.

Edad media (años) de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alcohol	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0	14,0	14,0	13,9
Inhalables volátiles	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8	14,0	14,9	15,3
Tabaco	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1
GHB	–	–	–	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8	14,2	14,4	15,0	14,7
Est. anabolizantes	–	–	–	–	–	–	–	–	14,3	14,5	14,4	14,1
Heroína	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0	14,5	14,7	14,1
Tabaco (consumo diario)	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6	14,7	14,7	14,6
Cannabis	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8	14,9	14,9	14,9
Cocaína base	–	–	–	15,0	15,0	14,6	15,2	14,8	14,6	15,1	14,9	14,7
Alucinógenos	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2	15,2	15,6	15,1
Alcohol (consumo semanal)	14,9	15,0	15,1	15,0	15,6	14,8	15,1	15,0	15,1	15,2	15,2	15,0
Cocaína polvo y/o base	15,8	15,7	15,8	15,3	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1	15,2	15,3	15,0
Metanfetamina	–	–	–	–	–	–	–	–	15,1	15,2	15,4	15,0
Setas mágicas	–	–	–	–	–	–	–	–	15,0	15,2	15,5	15,0
Cocaína polvo	–	–	–	15,4	15,4	15,4	15,6	15,1	15,2	15,3	15,4	15,1
Éxtasis	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2	15,4	15,4	15,4
Anfetaminas	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1	15,4	15,3	15,1
Hipnosedantes*	–	–	–	13,8	14,0	13,9	14,3	13,9	13,7	14,0	14,1	14,1
Hipnosedantes**	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,2	14,6	14,2	14,0	14,3	14,4	14,4

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Al igual que en otras mediciones, si analizamos las edades medias de inicio en el consumo según el sexo podemos observar que no existen grandes diferencias en el consumo de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias en base a dicho criterio. Llegando a coincidir en la edad en que se realiza el primer consumo de algunas sustancias, como son el tabaco y el alcohol.

Tabla 1.2.7.

Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (años). España, 2023.

	Total	Hombre	Mujer
Hipnosedantes*	14,1	13,8	14,2
Alcohol	13,9	13,9	13,9
Tabaco	14,1	14,1	14,1
Hipnosedantes**	14,4	14,2	14,5
GHB	14,7	14,5	15,0
Heroína	14,1	14,1	14,3
Inhalables volátiles	15,3	15,4	15,1
Esteroides anabolizantes	14,1	14,1	14,4
Tabaco (consumo diario)	14,6	14,7	14,6
Cannabis	14,9	14,9	14,9
Cocaína base	14,7	14,7	14,8
Alcohol (consumo semanal)	15,0	15,1	15,0
Alucinógenos	15,1	15,1	15,2
Setas mágicas	15,0	15,0	15,0
Cocaína polvo y/o base	15,0	15,0	15,0
Analgésicos opioides***	14,8	14,9	14,7
Metanfetamina	15,0	15,1	14,8
Cocaína en polvo	15,1	15,1	15,0
Anfetaminas	15,1	15,3	14,8
Éxtasis	15,4	15,5	15,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. ***Para colocarte

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Edad y sexo

La siguiente tabla presenta datos sobre la prevalencia de consumo de diversas drogas entre estudiantes de edades comprendidas entre 14 y 18 años en España durante el último año.

Respecto al **alcohol**, cabe destacar en la prevalencia de su consumo que, mientras que un 55% de los estudiantes de 14 años informa haber consumido alcohol en los últimos 12 meses, este porcentaje se eleva al 84,7% a los 17 años y al 86,5% en los estudiantes de 18 años.

La prevalencia de consumo de **tabaco** también aumenta con la edad. Se observa un aumento desde el 13,8% de los estudiantes de 14 años que reconocen haber fumado durante este periodo, hasta el 36,2% a los 17 años y en los estudiantes de 18 años, se llega a un valor del 40,8% de prevalencia para el consumo en el último año.

La prevalencia de consumo de **cannabis** empieza en un 9,8% a los 14 años y aumenta hasta un 30,3% a los 17 años. En el grupo de edad total entre 14 y 17 años, la prevalencia es del 20,7%, y para los estudiantes de 18 años, llega al 35,6%.

Las drogas estimulantes como la cocaína y el éxtasis tienen una prevalencia menor en comparación con el alcohol, el tabaco y el cannabis. En cuanto a la **cocaína**, un 1,5% de los estudiantes de 14 años refiere haberla consumido en los últimos 12 meses, esta cifra aumenta discretamente hasta llegar a los estudiantes de 17 años que mantienen una prevalencia 2,8%. A los 18 años, el consumo en los últimos 12 meses de la cocaína aumenta hasta el 4,5%.

En esta misma línea, el **éxtasis** mantiene bajos datos que pasan de un 1,0% con 14 años a un 3,0% con 17 años; tras la mayoría de edad se encuentra el pico máximo, con un 5,4% entre los estudiantes de 18 años, que junto con los inhalables volátiles (4,9%) han experimentado un crecimiento para este tramo de edad (2,8% y 1,5% en 2021 respectivamente).

Con relación a los **hipnosedantes** (con o sin receta), se aprecia que la prevalencia de consumo por edad oscila entre el 11,9%, registrado en los estudiantes de 14 años, y el 20,7%, que podemos observar en los alumnos de 18 años.

Tabla 1.2.8.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la edad (%). España, 2023.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Alcohol	55,0	67,7	79,3	84,7	72,7	86,5
Tabaco	13,8	23,3	30,8	36,2	26,7	40,8
Cannabis	9,8	16,6	23,9	30,3	20,7	35,6
Hipnosedantes*	11,9	13,5	14,9	16,6	14,3	20,7
Hipnosedantes**	5,6	6,4	8,0	8,4	7,2	10,3
Cocaína polvo y/o base	1,5	1,9	2,4	2,8	2,2	4,5
Cocaína polvo	1,3	1,6	2,1	2,5	1,9	4,1
Cocaína base	0,9	1,1	1,2	1,4	1,1	1,7
Éxtasis	1,0	1,3	2,4	3,0	2,0	5,4
Alucinógenos	0,8	1,1	1,4	1,6	1,3	2,7
Inhalables volátiles	0,8	1,3	2,3	3,0	1,9	4,9
Setas mágicas	0,5	1,0	1,2	1,1	1,0	1,8
Metanfetamina	0,6	0,8	1,1	1,5	1,0	2,6
Anfetaminas/speed	0,9	0,8	1,3	1,6	1,2	2,7
Heroína	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6
GHB	0,4	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
Esteroides anabolizantes	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,7
Analgésicos opioides***	0,9	1,1	1,4	1,5	1,3	2,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

***Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Respecto a la evolución de la prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo cabe destacar lo siguiente. En primer lugar, la tendencia general del estudio es una progresiva

bajada desde 1996, pero sí que existe un repunte de algunas drogas como el alcohol desde la última medición de 2021. Si bien en el consumo de **alcohol** se trata de un incremento generalizado tanto en hombres como en mujeres (pasa de un 71,6% en los hombres en 2021 a un 73,7% en 2023 y de un 76,3% en las mujeres de 2021 a un 78,1% en 2023).

Los **hipnosedantes** presentan la singularidad de mantener estable la prevalencia de consumo alguna vez en la vida, mientras que diferenciando por sexo se observan dos tendencias contrarias. Los hombres disminuyen el consumo de esta droga en ese periodo de tiempo (pasando de un 15,3% en 2021 a un 13,3% en 2023) y las mujeres aumentan el consumo de los hipnosedantes alguna vez en la vida (de un 24,1% en 2021 a un 26,1% en 2023).

El **tabaco** es otra de las drogas donde existe un mayor consumo por parte de las mujeres, ya que mientras ellas admiten consumirlo en un 36,8%, entre ellos el consumo desciende a un 30,0%. Esta tendencia se ve afianzada si se analizan los consumidores en los últimos 12 meses, ya que mientras que 1 de cada 3 estudiantes mujeres fuman algo menos (30,8%), tan sólo 1 de cada 4 estudiantes hombres consideran que fumaron en ese periodo de tiempo (24,7%).

Por otro lado, el **cannabis** y la **cocaína** serían las drogas con un mayor consumo entre hombres que entre mujeres. Esto es especialmente reseñable en la cocaína donde hay el doble de hombres (3,8%) que de mujeres (1,9%) que admiten haberla probado. Este dato aumenta proporcionalmente en el caso de consumidores de los últimos 30 días, ya que llega a ser el triple: mientras que hay un 1,5% de hombres, en mujeres tan sólo es un 0,5%.

Tabla 1.2.9.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses, en los últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	Prevalencia de consumo alguna vez en la vida																							
	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alcohol	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2	76,3	79,4	71,6	76,3	73,7	78,1
Tabaco	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	64,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7	38,2	44,3	35,1	41,5	30,0	36,8
Cannabis	36,2	30,1	40,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9	34,5	31,5	29,3	28	27,6	26,2
Hipnosedantes*	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	12,0	18,8	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1	14,4	21,5	15,1	21,5	15,3	24,1	13,3	26,1
Hipnosedantes**	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8	6,7	10,3	7,8	12,9	6,9	12,7
Cocaína polvo y/o base	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2	3,9	1,9	3,4	1,9	3,8	1,9
Éxtasis	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8	2,7	1,9	3,1	2,1	3,4	2,8	3,6	2,5
Alucinógenos	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2	2,1	1,1	2,7	1,2	2,3	1,1	2,4	1,4
Inhalables volátiles	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,1	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9	1,9	1,5	1,9	1,7	3,1	2,5
Setas mágicas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	1,4	1,8	0,8	2,0	0,8	2,4	1,0	1,8	0,8	2,0	1,0
Metanfetamina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	0,6	1,1	0,4	1,7	1,0	1,9	1,3	1,8	1,2	1,9	1,1
Anfetaminas	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,5	2,7	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9	2,2	1,2	2,0	1,1	1,9	1,0	2,3	1,2
Heroína	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5	1,0	0,4	0,8	0,2	1,0	0,4
GHB	–	–	–	–	–	–	1,8	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,9	0,8	1,3	0,8	0,8	0,4	0,7	0,4	0,6	0,2	1,0	0,4
Est. anabolizantes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,1	0,3	1,0	0,3	0,8	0,2	0,6	0,2	0,7	0,2	1,0	0,2

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses																								
Alcohol	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9	74,1	77,5	67,8	73,3	71,2	76,1
Tabaco	–	–	–	–	–	–	30,2	37,5	36,0	40,1	28,1	36,4	33,1	37,5	29,6	33,2	32,6	36,9	31,4	38,5	27,3	34,2	24,7	30,8
Cannabis	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	28,2	24,7	29,7	23,3	28,0	23,0	28,1	24,4	29,2	25,9	22,6	21,8	22,5	21
Hipnosedantes*	–	–	–	–	–	–	7,3	11,1	8,1	12,1	7,7	12,5	8,4	14,9	7,7	13,8	8,8	14,4	9,8	15,1	9,7	17,6	9,7	20
Hipnosedantes**	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7	4,7	7,4	5,1	9,4	5,3	9,5
Cocaína polvo y/o base	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6	3,2	1,7	2,7	1,5	3,2	1,5
Éxtasis	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,3	1,6	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6	2,0	1,1	2,4	1,4	2,1	1,5	2,6	1,8
Alucinógenos	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7	1,4	0,6	2,0	0,8	1,4	0,6	1,8	0,8
Inhalables volátiles	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,6	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,8	1,2	0,9	2,4	1,8
Setas mágicas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,1	0,8	1,2	0,5	1,3	0,5	1,7	0,6	1,1	0,5	1,5	0,6
Metanfetamina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	0,4	0,8	0,3	1,3	0,7	1,6	0,8	1,1	0,7	1,5	0,8
Anfetaminas	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,2	1,8	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,2	0,6	1,8	0,8
Heroína	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,5	0,2	0,8	0,2
GHB	–	–	–	–	–	–	1,3	0,4	1,2	0,4	1,0	0,5	1,5	0,5	0,9	0,4	0,6	0,2	0,5	0,3	0,5	0,1	0,8	0,3
Est. anabolizantes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	0,2	0,7	0,2	0,5	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1	0,8	0,1
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días																								
Alcohol	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1	57,2	59,8	51,5	55,8	54,5	58,7
Tabaco	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0	23,9	29,3	21,2	26,7	18,9	23,3
Cannabis	24,5	16,9	28,5	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	19,3	15,2	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9	21,5	17,3	15,7	14,1	16,7	14,5
Hipnosedantes*	–	–	–	–	–	–	3,5	5,5	4,0	6,1	4,0	6,6	4,7	8,5	4,2	8,1	4,4	7,3	5,1	7,7	5,0	10,0	5,4	11,0
Hipnosedantes**	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3	2,2	3,5	2,6	4,7	3,0	4,7
Cocaína polvo y/o base	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5	1,3	0,6	0,9	0,3	1,5	0,5
Éxtasis	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,5
Alucinógenos	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4	0,6	0,2	0,7	0,3	0,5	0,1	0,9	0,2
Inhalables volátiles	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2	0,6	0,4	0,6	0,3	1,2	0,8
Setas mágicas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	0,2	0,6	0,1	0,7	0,2	0,4	0,1	0,7	0,2
Metanfetamina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,1	0,6	0,2	0,7	0,3	0,5	0,2	0,8	0,3
Anfetaminas	2,6	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,5	0,8	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,6	0,1	1,0	0,3
Heroína	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2	0,6	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0	0,6	0,1
GHB	–	–	–	–	–	–	0,9	0,2	0,8	0,3	0,8	0,3	1,0	0,3	0,6	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0	0,5	0,1
Est. anabolizantes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0	0,6	0,1
Prevalencia de consumo a diario en los últimos 30 días																								
Alcohol	–	–	–	–	–	–	3,0	1,0	3,8	2,0	7,8	4,3	3,3	2,0	2,2	1,3	1,9	1,3	1,3	0,7	1,3	1,0	2,2	0,9
Tabaco	19,3	27,0	17,2	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0	9,4	10,3	8,8	9,2	6,9	8,1
Cannabis	5,5	1,9	5,5	2,1	7,0	2,9	4,2	2,2	4,4	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3	3,3	1,4	2,1	1,1	1,7	1,0
Hipnosedantes*	–	–	–	–	–	–	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9	2,3	3,0	2,5	3,4	2,6	4,7	3,3	6,6
Hipnosedantes**	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	1,0	1,2	1,0	1,3	1,1	1,8	1,8	2,5

H = Hombres, M = Mujeres.

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Comunidad/Ciudad Autónoma

Este apartado recoge las prevalencias de las drogas con mayor nivel de consumo (en concreto, alcohol, tabaco y cannabis) a nivel autonómico y en los diferentes periodos temporales analizados.

En primer lugar, nos encontramos que la horquilla de edades a las que se empieza a consumir el **tabaco** es relativamente similar en todas las comunidades ya que sólo nos encontramos un desajuste de 0,5 años entre las comunidades con la edad más corta, Cataluña y Canarias con 13,9 años, y la ciudad autónoma con los estudiantes que más tarde comienzan a fumar que es Melilla con 14,5. Además, en todas las regiones transcurre menos de un año entre el primer consumo y la adquisición del hábito de fumar a diario.

En cuanto al **alcohol**, nos encontramos que, entre Aragón, cuya media es la más baja con 13,6 años de media y Ceuta cuya media es la más alta con 14,5 años, hay algo menos de un año de diferencia en la edad media de inicio en el consumo.

Por último, si nos fijamos en la edad de inicio en el consumo de **cannabis**, nos encontramos que en Cataluña la edad media es la más baja con 14,7 años, obteniéndose la mayor edad de inicio en Ceuta o Melilla con 15,2 años, tan sólo habiendo medio año aproximadamente de diferencia.

Tabla 1.2.10.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

	Tamaño de muestra	Edad media inicio en el consumo de tabaco	Edad media inicio en el consumo de tabaco diario	Edad media inicio en el consumo de alcohol	Edad media inicio en el consumo de cannabis
Andalucía	4.021	14,2	14,6	14,0	15,1
Aragón	2.251	14,0	14,4	13,6	14,9
Asturias	2.015	14,2	14,5	14,0	14,9
Baleares	2.207	14,1	14,7	14,0	14,9
Canarias	2.488	13,9	14,3	13,9	14,8
Cantabria	1.865	14,1	14,3	13,9	14,9
Castilla y León	2.574	14,1	14,7	13,8	15,0
Castilla-La Mancha	2.110	14,0	14,4	13,8	14,9
Cataluña	2.675	13,9	14,4	13,7	14,7
C. Valenciana	3.636	14,2	14,8	13,7	14,9
Extremadura	847	14,0	14,6	13,9	15,0
Galicia	2.185	14,2	14,8	14,2	15,0
Madrid	3.901	14,1	14,8	13,9	14,9
Murcia	2.100	14,0	14,6	13,7	14,9
Navarra	2.151	14,3	14,9	13,9	14,8
País Vasco	1.184	14,2	14,7	13,7	14,9
La Rioja	1.586	14,0	14,5	13,9	14,8
Ceuta	682	14,4	15,2	14,5	15,2
Melilla	1.730	14,5	14,4	14,0	15,2
Total	42.208	14,1	14,6	13,9	14,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Si se habla específicamente de **consumo de tabaco**, el porcentaje de alumnos que ha fumado en alguna ocasión tiene su mayor porcentaje en Extremadura, con un 38,4%, que también se encuentra a la cabeza entre los fumadores habituales con un 25,9%, es decir, que 1 de cada 4 estudiantes extremeños han fumado en los últimos 30 días. Por el contrario, y sin tener en cuenta a Ceuta y Melilla, las prevalencias de consumo menores para esta sustancia, con independencia del tramo temporal, son para las Canarias.

Tabla 1.2.11.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

		Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Tamaño de muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	33,7	32,2	35,2	28,1	26,7	29,5	21,1	19,9	22,4
Aragón	2.251	37,8	35,7	39,8	32,5	31,0	34,4	25,3	23,5	27,1
Asturias	2.015	33,1	31,0	35,1	28,5	27,1	30,5	21,6	19,8	23,4
Baleares	2.207	34,5	32,5	36,5	29,1	27,7	31,0	22,2	20,4	23,9
Canarias	2.488	28,8	27,0	30,6	22,7	21,4	24,3	16,5	15,0	18,0
Cantabria	1.865	34,8	32,7	37,0	29,3	27,9	31,3	21,8	19,9	23,7
Castilla y León	2.574	36,4	34,5	38,2	31,1	29,7	32,9	23,9	22,3	25,6
Castilla - La Mancha	2.110	35,8	33,7	37,8	28,9	27,5	30,9	22,2	20,5	24,0
Cataluña	2.675	31,8	30,0	33,5	26,5	25,1	28,2	19,9	18,4	21,4
C. Valenciana	3.636	33,1	31,6	34,6	27,1	25,7	28,5	19,7	18,4	20,9
Extremadura	847	38,4	35,2	41,7	32,9	31,5	36,1	25,9	23,0	28,9
Galicia	2.185	36,0	33,9	38,0	30,9	29,5	32,8	25,0	23,2	26,8
Madrid	3.901	33,1	31,6	34,6	27,1	25,7	28,5	21,2	20,0	22,5
Murcia	2.100	31,1	29,1	33,1	25,6	24,3	27,5	18,7	17,0	20,4
Navarra	2.151	35,7	33,7	37,7	30,2	28,8	32,1	22,5	20,7	24,2
País Vasco	1.184	33,1	30,4	35,8	27,1	25,7	29,6	20,5	18,2	22,8
La Rioja	1.586	31,2	28,9	33,5	26,0	24,6	28,1	20,6	18,7	22,6
Ceuta	682	13,5	10,9	16,0	9,0	8,1	11,2	7,5	5,6	9,5
Melilla	1.730	13,5	11,9	15,1	10,8	9,8	12,3	7,6	6,3	8,8
Total	42.208	33,4	32,9	33,8	27,7	26,3	28,1	21,0	20,6	21,4

CONSUMO DE TABACO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 21,0%

- < media España
- = media España
- > media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.12.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	31,0	36,7	26,6	29,8	20,4	21,9
Aragón	36,0	39,8	31,0	34,2	24,3	26,6
Asturias	27,9	39,0	24,5	33,2	18,9	24,8
Baleares	31,5	37,5	26,4	31,7	19,8	24,5
Canarias	26,8	30,9	20,3	25,0	15,0	18,0
Cantabria	29,9	39,9	25,4	33,3	18,4	25,3
Castilla y León	34,4	38,2	29,3	32,9	22,7	25,1
Castilla - La Mancha	33,3	38,3	27,3	30,6	20,8	23,7
Cataluña	27,1	36,2	22,0	30,9	16,3	23,3
C. Valenciana	29,1	37,2	22,8	31,3	16,9	22,4
Extremadura	38,7	38,1	32,6	33,2	26,4	25,4
Galicia	35,0	37,1	29,2	32,8	23,9	26,2
Madrid	26,8	39,0	21,1	32,7	16,2	26,0
Murcia	29,1	33,1	23,1	28,2	17,2	20,2
Navarra	32,2	39,4	27,0	33,5	20,2	24,9
País Vasco	32,1	34,4	26,7	27,7	20,7	20,2
La Rioja	31,3	31,1	25,0	27,3	19,4	22,2
Ceuta	14,0	13,1	9,0	9,0	8,1	7,1
Melilla	14,5	12,7	12,4	9,5	9,1	6,3
Total	30,0	36,8	24,7	30,8	18,9	23,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Como ya pudimos observar en anteriores tablas, en general las mujeres tienen mayores datos de consumo de tabaco que los hombres con independencia tanto de la comunidad (a excepción de Extremadura, Ceuta y Melilla) como del ámbito temporal de consumo: las mujeres estudiantes de 14 a 18 años fuman tabaco en mayor medida que los hombres, esta diferencia es especialmente visible en Madrid donde hay una diferencia de 12,2 puntos porcentuales entre ambos.

Si se observa el consumo de **alcohol**, se puede ver que Extremadura esta considerablemente por encima del resto de comunidades autónomas en todas las escalas temporales reflejadas en el estudio. Mientras que Murcia (excluyendo Ceuta y Melilla) sigue siendo la comunidad que registra prevalencias de consumo menor, seguida de cerca por Cataluña.

Tabla 1.2.13.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

		Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Tamaño de muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	77,9	76,6	79,2	76,0	74,7	77,3	59,6	58,1	61,1
Aragón	2.251	80,7	79,1	82,3	78,7	77,4	80,4	62,1	60,1	64,1
Asturias	2.015	77,2	75,3	79,0	75,5	74,1	77,4	58,7	56,6	60,9
Baleares	2.207	75,9	74,1	77,7	72,9	71,5	74,8	52,1	50,0	54,1
Canarias	2.488	73,2	71,5	75,0	70,4	69,0	72,2	51,3	49,4	53,3
Cantabria	1.865	76,2	74,3	78,2	74,1	72,8	76,1	59,1	56,9	61,4
Castilla y León	2.574	80,9	79,4	82,4	79,1	77,8	80,7	61,5	59,6	63,3
Castilla - La Mancha	2.110	80,0	78,3	81,7	78,1	76,8	79,9	63,2	61,1	65,3
Cataluña	2.675	72,7	71,0	74,3	70,1	68,7	71,9	52,7	50,8	54,6
C. Valenciana	3.636	76,1	74,7	77,5	73,3	72,0	74,8	55,6	54,0	57,2
Extremadura	847	83,0	80,4	85,5	81,1	79,8	83,7	67,9	64,7	71,0
Galicia	2.185	75,4	73,6	77,2	73,7	72,3	75,5	58,8	56,7	60,8
Madrid	3.901	74,8	73,4	76,1	72,4	71,0	73,8	53,2	51,7	54,8
Murcia	2.100	72,5	70,6	74,4	69,8	68,3	71,7	52,4	50,3	54,5
Navarra	2.151	80,1	78,4	81,8	78,1	76,8	79,9	64,1	62,0	66,1
País Vasco	1.184	75,2	72,7	77,6	72,6	71,3	75,2	57,9	55,1	60,7
La Rioja	1.586	75,3	73,1	77,4	74,0	72,7	76,2	59,8	57,4	62,2
Ceuta	682	34,4	30,9	38,0	34,0	32,5	37,5	25,3	22,0	28,5
Melilla	1.730	41,2	38,9	43,5	39,5	37,9	41,8	28,6	26,5	30,7
Total	42.208	75,9	75,5	76,3	73,6	72,2	74,0	56,6	56,1	57,0

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 56,6%

- < media España
- = media España
- > media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.14.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	74,4	81,7	72,4	79,9	56,6	62,9
Aragón	81,1	80,2	78,7	78,8	63,1	60,9
Asturias	73,4	81,5	71,4	80,2	56,0	61,9
Baleares	72,8	78,9	70,0	75,8	48,4	55,6
Canarias	70,7	75,8	67,7	73,1	49,0	53,7
Cantabria	73,4	79,1	71,8	76,4	56,2	62,2
Castilla y León	81,1	80,7	78,8	79,4	60,1	62,8
Castilla - La Mancha	78,0	82,1	75,8	80,5	60,8	65,7
Cataluña	70,5	74,8	67,8	72,3	51,3	54,1
C. Valenciana	74,4	77,8	71,0	75,6	53,4	57,8
Extremadura	81,6	84,4	79,7	82,6	68,1	67,6
Galicia	73,8	77,1	72,5	75,0	58,1	59,5
Madrid	72,6	76,8	70,1	74,5	50,0	56,3
Murcia	71,5	73,5	68,9	70,6	51,8	53,0
Navarra	77,6	82,6	75,5	80,8	60,8	67,5
País Vasco	71,5	80,0	67,7	79,1	54,8	61,9
La Rioja	74,7	76,0	73,1	75,2	58,6	61,3
Ceuta	35,7	33,4	35,7	32,6	27,2	23,7
Melilla	41,5	40,9	40,3	38,8	29,0	28,3
Total	73,7	78,1	71,2	76,1	54,5	58,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Si se observan las prevalencias de consumo de **bebidas alcohólicas** según la comunidad autónoma y el sexo de los alumnos, las mujeres muestran porcentajes más altos que los hombres, especialmente en el País Vasco. No obstante, cuando se observa el consumo habitual (últimos 30 días) por regiones, encontramos que, junto al País Vasco, Baleares, es la CA con mayor diferencia en el consumo del alcohol por sexos.

Por otra parte, se puede observar que Aragón y Extremadura son las únicas comunidades autónomas que mantienen otra tendencia respecto al consumo de alcohol, ya que en ellas se experimenta que las borracheras entre los hombres se encuentran por encima del de las mujeres.

Respecto a la prevalencia de **borracheras** según comunidad autónoma, se observa que Navarra es la región que alcanza el máximo nacional para dos de los tres indicadores registrados (58,7% en alguna vez vida, 52,5% en los últimos 12 meses), mientras que Extremadura mantiene la mayor prevalencia de borrachera entre los que la situaron en los últimos 30 días con un 29,6%.

Tabla 1.2.15.

Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

		Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Tamaño de muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	49,5	47,9	51,0	44,1	42,5	45,6	21,5	20,3	22,8
Aragón	2.251	55,5	53,4	57,5	50,2	48,6	52,2	25,1	23,4	26,9
Asturias	2.015	47,7	45,5	49,9	44,0	42,4	46,1	22,4	20,6	24,2
Baleares	2.207	45,6	43,5	47,7	40,7	39,2	42,8	18,6	17,0	20,3
Canarias	2.488	39,7	37,7	41,6	33,6	32,2	35,5	14,4	13,0	15,8
Cantabria	1.865	47,6	45,3	49,9	42,4	40,9	44,7	22,9	21,0	24,8
Castilla y León	2.574	53,4	51,5	55,4	47,8	46,3	49,8	22,5	20,9	24,1
Castilla - La Mancha	2.110	53,2	51,1	55,4	46,9	45,3	49,0	23,8	22,0	25,6
Cataluña	2.675	43,7	41,8	45,5	38,2	36,7	40,0	18,8	17,3	20,2
C. Valenciana	3.636	48,3	46,7	49,9	42,8	41,3	44,4	19,4	18,1	20,7
Extremadura	847	53,6	50,3	57,0	48,0	46,5	51,4	29,6	26,5	32,6
Galicia	2.185	46,3	44,2	48,4	42,1	40,5	44,1	23,3	21,5	25,0
Madrid	3.901	47,6	46,0	49,1	42,0	40,5	43,6	20,0	18,7	21,2
Murcia	2.100	42,4	40,3	44,5	37,2	35,7	39,3	17,0	15,4	18,7
Navarra	2.151	58,7	56,6	60,7	52,5	50,9	54,6	29,4	27,5	31,3
País Vasco	1.184	45,0	42,1	47,8	41,3	39,8	44,1	24,7	22,2	27,1
La Rioja	1.586	50,0	47,5	52,5	46,0	44,5	48,5	23,8	21,7	25,9
Ceuta	682	15,1	12,4	17,8	13,3	12,3	15,9	5,6	3,9	7,3
Melilla	1.730	19,8	17,9	21,7	16,3	15,2	18,0	7,5	6,3	8,7
Total	42.208	47,5	47,0	48,0	42,1	40,6	42,6	20,8	20,4	21,2

PREVALENCIA DE BORRACHERAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 20,8%

- < media España
- = media España
- > media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.16.

Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	45,5	53,9	41,1	47,3	20,7	22,4
Aragón	55,2	55,7	51,2	49,0	25,9	24,3
Asturias	44,0	52,0	40,5	47,9	22,0	22,8
Baleares	40,3	50,7	36,4	44,9	15,7	21,5
Canarias	36,5	42,8	32,0	35,3	13,3	15,5
Cantabria	42,9	52,4	37,5	47,4	21,2	24,6
Castilla y León	51,9	54,9	46,9	48,7	22,6	22,4
Castilla - La Mancha	49,8	56,8	45,0	48,8	24,8	22,8
Cataluña	39,1	48,0	34,2	41,9	17,3	20,2
C. Valenciana	44,0	52,5	37,9	47,7	17,5	21,3
Extremadura	55,0	52,1	48,9	47,1	31,1	27,9
Galicia	45,2	47,4	41,5	42,7	22,8	23,7
Madrid	43,4	51,5	39,1	44,8	17,5	22,3
Murcia	39,0	45,8	35,1	39,3	16,7	17,4
Navarra	54,2	63,2	48,9	56,1	29,1	29,7
País Vasco	40,0	51,4	36,3	47,7	22,2	27,9
La Rioja	48,2	52,2	44,3	48,1	24,1	23,4
Ceuta	13,9	16,0	11,7	14,6	5,7	5,5
Melilla	18,0	21,3	15,5	16,9	8,3	6,8
Total	43,9	51,2	39,3	45,1	19,7	21,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Siguiendo con todas las tendencias observadas de consumo de alcohol, el botellón es un fenómeno que tiene una mayor prevalencia entre las chicas de 14 a 18 años en todas las comunidades autónomas salvo Extremadura. En comparación a los chicos, las mayores diferencias se vuelven a dar en el País Vasco (10,4 puntos porcentuales).

Respecto al **consumo de cannabis** se observa que las mayores prevalencias de consumo en los dos indicadores temporales se establecen entre los estudiantes de Baleares con un consumo de 31,4% de prevalencia para los que admiten haberlo consumido alguna vez y de 26,5% de prevalencia para los que admiten haberlo consumido en los últimos 12 meses.

Por otra parte, Murcia presenta una prevalencia de consumo de cannabis del 17,6% en el tramo temporal de los últimos 12 meses.

Tabla 1.2.17.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

		Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Tamaño de muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	23,3	22,0	24,6	18,7	17,5	19,9	13,6	12,6	14,7
Aragón	2.251	28,8	27,0	30,7	23,6	22,3	25,4	16,9	15,3	18,4
Asturias	2.015	27,1	25,2	29,1	22,2	20,9	24,0	15,6	14,0	17,1
Baleares	2.207	31,4	29,4	33,3	26,5	25,2	28,4	19,0	17,4	20,7
Canarias	2.488	26,1	24,4	27,8	21,1	19,8	22,7	15,9	14,5	17,4
Cantabria	1.865	28,7	26,6	30,7	24,0	22,6	25,9	17,9	16,2	19,7
Castilla y León	2.574	27,5	25,7	29,2	22,0	20,7	23,6	14,8	13,4	16,2
Castilla-La Mancha	2.110	26,2	24,3	28,1	20,4	19,1	22,1	14,4	12,9	15,9
Cataluña	2.675	29,6	27,8	31,3	24,0	22,6	25,6	17,0	15,6	18,4
C. Valenciana	3.636	29,0	27,6	30,5	22,3	21,0	23,6	15,5	14,3	16,7
Extremadura	847	25,9	23,0	28,9	20,5	19,3	23,2	14,9	12,5	17,3
Galicia	2.185	28,6	26,7	30,5	24,7	23,4	26,5	18,5	16,9	20,2
Madrid	3.901	26,9	25,5	28,3	21,8	20,5	23,1	15,1	14,0	16,3
Murcia	2.100	22,0	20,2	23,8	17,6	16,4	19,2	12,4	11,0	13,8
Navarra	2.151	28,0	26,2	29,9	23,4	22,1	25,2	16,9	15,3	18,4
País Vasco	1.184	28,7	26,2	31,3	24,1	22,7	26,5	19,3	17,1	21,5
La Rioja	1.586	24,8	22,7	26,9	20,3	19,1	22,3	14,4	12,7	16,1
Ceuta	682	11,1	8,7	13,4	7,8	7,0	9,8	5,6	3,8	7,3
Melilla	1.730	10,8	9,3	12,3	8,3	7,4	9,6	6,1	4,9	7,2
Total	42.208	26,9	26,5	27,4	21,8	20,5	22,1	15,6	15,3	16,0

PREVALENCIA DE CONSUMO DE CANNABIS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 15,6%

- < media España
- = media España
- > media España

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.18.

Prevalencia de consumo de cannabis alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	24,7	21,8	20,0	17,2
Aragón	30,6	26,8	26,2	20,6
Asturias	26,9	27,5	22,1	22,3
Baleares	30,9	31,8	26,6	26,4
Canarias	26,9	25,3	21,8	20,3
Cantabria	29,4	28,0	23,8	24,1
Castilla y León	28,8	26,2	23,9	20,1
Castilla - La Mancha	26,8	25,6	20,9	19,8
Cataluña	29,3	29,8	24,0	23,9
C. Valenciana	29,2	28,9	22,5	22,1
Extremadura	28,9	22,6	22,7	18,1
Galicia	31,1	25,9	26,7	22,4
Madrid	26,1	27,6	20,7	22,8
Murcia	24,5	19,5	20,0	15,2
Navarra	28,5	27,6	24,3	22,5
País Vasco	30,8	26,1	26,1	21,5
La Rioja	27,2	21,8	22,1	18,2
Ceuta	10,6	11,4	8,5	7,3
Melilla	12,8	9,1	10,6	6,4
Total	27,6	26,2	22,5	21,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Como se ha podido observar, el cannabis en general es la sustancia que más consumen los hombres con respecto a las mujeres en los últimos 12 meses; esto se traslada de igual modo a todo el territorio español a excepción de Asturias, Cantabria y Madrid. La mayor diferencia la encontramos en Madrid, donde las mujeres consumen 2,1 puntos porcentuales por encima de los hombres.

Sobre el uso de **cigarrillos electrónicos**, Andalucía se coloca como la comunidad autónoma que tiene mayor representación tanto dentro de los alumnos que han consumido sólo alguna vez en la vida como entre los que la han consumido en los últimos 12 meses, siendo junto con Extremadura la única comunidad que supera el 50% en el tramo de los últimos 12 meses. Seguido de estos se encuentran las comunidades de Castilla-La Mancha y Murcia.

Tabla 1.2.19.

Prevalencias de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2023.

		Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses		
	Tamaño de muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.021	62,7	61,3	64,2	55,3	53,8	56,9
Aragón	2.251	51,2	49,1	53,2	40,8	39,3	42,8
Asturias	2.015	47,3	45,1	49,4	36,2	34,7	38,3
Baleares	2.207	53,9	51,8	55,9	45,4	43,8	47,5
Canarias	2.488	53,6	51,6	55,6	47,1	45,5	49,1
Cantabria	1.865	51,5	49,3	53,8	39,3	37,8	41,5
Castilla y León	2.574	53,1	51,1	55,0	42,3	40,8	44,2
Castilla - La Mancha	2.110	59,9	57,8	61,9	49,2	47,6	51,3
Cataluña	2.675	52,3	50,4	54,2	44,0	42,5	45,9
C. Valenciana	3.636	52,9	51,2	54,5	47,4	45,8	49,0
Extremadura	847	62,0	58,7	65,2	50,8	49,3	54,2
Galicia	2.185	49,9	47,8	52,0	41,6	40,1	43,7
Madrid	3.901	53,0	51,5	54,6	43,5	42,0	45,1
Murcia	2.100	57,2	55,1	59,3	49,8	48,3	51,9
Navarra	2.151	48,5	46,4	50,6	36,6	35,2	38,7
País Vasco	1.184	45,6	42,8	48,5	31,9	30,4	34,5
La Rioja	1.586	45,5	43,1	48,0	34,6	33,1	36,9
Ceuta	682	31,4	27,9	34,9	25,9	24,5	29,2
Melilla	1.730	34,0	31,8	36,2	26,9	25,5	29,0
Total	42.208	54,6	54,1	55,1	46,0	44,4	46,4

PREVALENCIA DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media nacional 46,0%

- < media España
- = media España
- > media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.20.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	59,7	66,1	52,9	58,0
Aragón	52,6	49,6	42,9	38,4
Asturias	42,9	52,3	30,4	42,7
Baleares	51,3	56,3	42,3	48,4
Canarias	50,1	57,1	44,1	50,0
Cantabria	48,0	55,2	36,6	41,9
Castilla y León	52,7	53,4	40,8	43,8
Castilla - La Mancha	58,0	61,7	46,8	51,5
Cataluña	50,9	53,7	43,1	44,9
C. Valenciana	49,9	55,8	44,5	50,1
Extremadura	62,5	61,4	51,7	49,8
Galicia	48,0	52,0	39,9	43,4
Madrid	49,3	56,6	38,9	47,7
Murcia	56,6	57,8	49,8	49,8
Navarra	49,5	47,5	36,6	36,7
País Vasco	45,6	45,6	30,6	33,5
La Rioja	46,1	44,8	32,7	36,9
Ceuta	31,7	31,1	26,9	25,0
Melilla	31,5	36,0	26,9	26,9
Total	52,5	56,8	43,8	48,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Los datos de uso de cigarrillos electrónicos según comunidad autónoma y sexo de los estudiantes de 14 a 18 años informan de que existe un cambio de tendencia ya que, si en el año 2021 se observó que el consumo de esta sustancia estaba más extendido en los chicos que en las chicas, esta tendencia en la actualidad no está tan clara: a excepción de Aragón, Navarra, La Rioja y Extremadura, el consumo de esta droga se encuentra más extendido entre las mujeres.

Bebidas alcohólicas

De entre todas las sustancias analizadas en la encuesta ESTUDES, el **alcohol** es la sustancia psicoactiva más consumida por los estudiantes de entre 14 y 18 años. El 75,9% reconoce haber consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión en su vida, encontrando que la gran mayoría de estos casos ha tomado alcohol en los últimos 12 meses, pues la prevalencia en este tramo temporal se sitúa en el 73,6%.

Respecto a los últimos 30 días, algo más de la mitad de los estudiantes (56,6%) reconoce haber bebido alcohol, observando que el 20,8% ha experimentado alguna borrachera en este mismo periodo y el 28,2% ha realizado *binge drinking,* es decir, ha tomado 5 o más vasos de bebidas alcohólicas en un intervalo aproximado de dos horas.

Contextualizando con la serie histórica, y aunque desde 2012 se registra una tendencia general hacia un menor consumo de alcohol, se produce un pequeño repunte respecto a los datos obtenidos en la encuesta realizada en 2021. El tramo temporal de alguna vez en la vida se incrementa dos puntos porcentuales, elevándose este incremento hasta los tres puntos para los últimos 12 meses y los últimos 30 días.

Figura 1.2.1.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) (%), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo semanal (años), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9	73,9	75,9
Últimos 12 meses	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9	70,5	73,6
Últimos 30 días	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5	53,6	56,6
Borracheras últimos 30 días	21,7	20,2	28,0	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2	21,8	24,3	23,2	20,8
Binge drinking últimos 30 días	–	–	–	–	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7	32,3	27,9	28,2
Edad media de inicio consumo	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0	14,0	14,0	13,9
Edad media de consumo semanal	14,9	15,0	15,1	15,0	14,8	14,8	15,1	15,0	15,1	15,2	15,2	15,0
Edad primera borrachera	–	–	–	–	–	–	14,8	14,6	14,7	14,8	14,7	14,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

A pesar de este ligero incremento en la prevalencia en el consumo de alcohol en los últimos 30 días, ha disminuido la proporción de estudiantes que se ha emborrachado en ese mismo plazo temporal (23,2% en 2021 y 20,8% en 2023), registrándose el dato más bajo de la serie desde 2002. En cuanto al consumo de alcohol en atracón, se registra un dato similar al de 2021, pasando de 27,9% a 28,2%. Ambos indicadores muestran un menor consumo intensivo de alcohol entre los estudiantes que consumen este tipo de sustancias de manera frecuente.

Por último, respecto a la edad en la que comienza el consumo de esta droga, se observa que aquellos que han tomado bebidas alcohólicas alguna vez en su vida declaran que su primer consumo fue con 13,9 años de media, similar al promedio que se ha ido obteniendo en la última década. El consumo semanal de alcohol comienza, por término medio, a los 15 años, y la primera borrachera se experimenta a los 14,5 años, registrándose en esta ocasión la edad más precoz de las detectadas desde 2012, primer año en el que se registró este dato.

Si se observa el nivel de consumo de alcohol según el **sexo** de los estudiantes, se ve un consumo más elevado de esta sustancia en los últimos 12 meses en las chicas que en los chicos. Atendiendo a la serie histórica, aunque la prevalencia en las mujeres ha sido mayor que en los hombres desde 1996, la brecha se ha ido incrementando desde 2012 registrándose en esta ocasión una diferencia de 4,5 puntos porcentuales (73,7% entre los hombres y 78,1% entre las mujeres).

Figura 1.2.2.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombre	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9	75,3	74,3	74,1	67,8	71,2
Mujer	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9	78,2	76,9	77,5	73,3	76,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En el plazo de los últimos 30 días, se sigue observando un mayor consumo de alcohol entre las mujeres. En términos evolutivos, se detecta, de nuevo, un incremento de esa diferencia desde 2012 y que alcanzó su máximo el pasado 2021 (5,5 puntos porcentuales), registrándose un ligero acercamiento de las prevalencias este 2023 (71,2% entre los hombres y 76,1% entre las mujeres).

Figura 1.2.3.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombre	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9	66,9	65,9	57,2	51,5	54,5
Mujer	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2	69,5	68,1	59,8	55,8	58,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En cuanto a la **edad** de los estudiantes, se observa que a medida que aumenta la edad lo hace el consumo de alcohol en todos los tramos de tiempo analizados, registrándose los mayores incrementos cuando se pasa de 14 a 16 años y se reducen considerablemente de los 17 a los 18 años. En el tramo de los últimos 30 días es donde se registran las mayores diferencias por edad, encontrando entre los estudiantes de 14 años una prevalencia de consumo de alcohol del 36,5% que llega a duplicarse hasta alcanzar el 73,8% entre los de 18 años.

La **edad de inicio en el consumo de alcohol** (tabla 1.2.21) coincide en chicos y chicas (13,9 años), edad que lleva siendo muy similar para ambos sexos desde 2006. La edad a la que se empiezan a beber alcohol semanalmente se sitúa en torno a los 15 años para chicos y chicas, siendo una cifra que se ha mantenido con escasa variación a lo largo de la serie histórica.

Tabla 1.2.21.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2000-2023.

	Alguna vez en la vida											
	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9	73,9	75,9
Sexo												
Hombre	78,2	75,9	81,5	78,4	80,8	74,9	82,9	77,8	75,7	76,3	71,6	73,7
Mujer	77,9	77,2	82,5	80,7	81,7	75,2	84,9	80,1	78,2	79,4	76,3	78,1
Edad												
14 años	52,4	52,7	59,2	57,1	62,6	49,7	65,9	60,1	57,1	58,3	53,5	58,0
15 años	73,4	70,4	76,6	76,1	78,7	71,5	77,7	73,7	75,4	72,5	68,3	70,1
16 años	83,1	81,7	86,9	86,0	86,2	81,6	86,2	84,1	83,1	84,3	78,8	81,2
17 años	89,6	89,0	91,9	91,2	90,5	87,8	90,8	90,6	89,9	88,5	86,0	86,7
18 años	93,8	92,2	93,8	92,3	92,3	88,6	92,6	92,4	91,9	89,0	87,9	88,2

Últimos 12 meses												
	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9	70,5	73,6
Sexo												
Hombre	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9	75,3	74,3	74,1	67,8	71,2
Mujer	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9	78,2	76,9	77,5	73,3	76,1
Edad												
14 años	51,5	52,0	57,9	50,9	53,1	48,0	63,1	57,4	55,3	56,1	50,6	55,0
15 años	72,7	69,7	75,6	70,9	69,6	70,0	75,3	71,2	73,9	70,2	64,5	67,7
16 años	82,4	80,9	85,9	82,1	77,6	80,3	84,2	82,2	82,1	82,5	75,3	79,3
17 años	88,7	87,6	91,1	87,4	84,1	86,1	89,2	88,7	88,7	86,7	82,6	84,7
18 años	93,3	91,2	93,0	88,2	84,2	86,4	91,3	90,7	90,6	86,9	85,2	86,5
Últimos 30 días												
	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5	53,6	56,6
Sexo												
Hombre	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9	66,9	65,9	57,2	51,5	54,5
Mujer	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2	69,5	68,1	59,8	55,8	58,7
Edad												
14 años	32,1	27,7	38,0	31,7	36,2	38,1	53,2	48,4	46,1	36,0	34,1	36,5
15 años	51,8	47,7	57,7	50,7	52,9	58,9	66,0	61,3	64,6	49,9	45,9	49,2
16 años	65,7	61,6	71,9	65,3	63,8	70,0	75,6	74,0	73,1	65,3	57,1	61,7
17 años	73,7	71,5	78,2	74,2	71,9	74,8	82,4	80,8	81,2	72,9	66,9	69,7
18 años	82,7	76,8	81,5	76,5	75,1	77,1	86,4	84,8	84,5	74,7	72,8	73,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.22.

Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio del consumo (años)	13,4	13,8	13,4	13,8	13,6	13,9	13,7	13,8	13,6	13,8	13,7	13,7	13,8	13,9	13,8	13,9	13,9	14,0	14,0	14,1	14,0	14,0	13,9	13,9
Edad media de inicio del consumo de alcohol semanal (años)	14,8	14,9	15,0	14,9	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	15,1	15,0	15,1	14,9	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2	15,3	15,1	15,0
Prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida (%)	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2	76,3	79,4	71,6	76,3	73,7	78,1
Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses (%)	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9	74,1	77,5	67,8	73,3	71,2	76,1
Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días (%)	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1	57,2	59,8	51,5	55,8	54,5	58,7

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Intoxicaciones etílicas agudas (borracheras)

El 47,5% de los alumnos declara haberse emborrachado alguna vez en la vida, habiéndolo hecho en el último año el 42,1%. La prevalencia se reduce hasta el 20,8% en los últimos 30 días.

La prevalencia de las intoxicaciones etílicas agudas o borracheras muestra ciertas diferencias en función del sexo y de la edad de los estudiantes (tabla 1.2.23). Atendiendo al **sexo**, vemos que entre las chicas hay más presencia de aquellas que se han emborrachado en todos los tramos temporales, si bien, esta diferencia se acorta a medida que lo hace el plano temporal analizado: 7,3 puntos porcentuales para alguna vez en la vida, 5,8 en los últimos 12 meses y 2,2 en los últimos 30 días.

En cuanto a la **edad**, vemos que la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas aumenta a medida que lo hace la edad, con independencia del plazo temporal analizado, pero con diferentes incrementos a medida que aumentamos de año en año. Así, el 22,5% de los alumnos de 14 años ya ha sufrido una intoxicación etílica aguda alguna vez, aumentando este porcentaje en 15,8 puntos porcentuales para los de 15 años (38,3%) y registrándose el mismo incremento para los de 16 años (54,1%). En el siguiente grupo de edad, el de 17 años, este porcentaje escala cerca de 10 puntos (hasta el 63,8%), reduciéndose su incremento a la mitad para los de 18 años (68,5%).

Tabla 1.2.23.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2010-2023.

	Alguna vez en la vida							Últimos 12 meses							Últimos 30 días						
	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Total	58,8	60,7	50,1	48,9	51,1	48,0	47,5	52,9	52,0	42,6	42,4	44,5	39,4	42,1	35,6	30,8	22,2	21,8	24,3	23,2	20,8
Sexo																					
Hombres	58,0	59,9	48,7	46,4	48,5	43,8	43,9	52,2	51,7	41,5	40,1	42,3	35,4	39,3	36,4	31,3	22,3	21,2	23,7	20,8	19,7
Mujeres	59,5	61,5	51,4	51,4	53,4	52,4	51,2	53,5	52,3	43,7	44,8	46,5	43,6	45,1	34,8	30,3	22,1	22,3	25,0	25,6	21,9
Edad																					
14 años	27,8	31,5	23,2	23,1	25,8	24,7	22,5	24,6	26,1	19,0	18,8	22,2	20,8	19,5	16,0	12,7	7,6	7,9	9,7	11,7	8,1
15 años	52,2	47,4	39,8	42,4	40,9	36,9	38,3	47,3	40,2	33,6	36,1	35,6	30,8	33,9	32,0	21,3	14,9	15,8	17,5	16,9	15,2
16 años	66,2	62,3	56,5	55,9	57,4	53,4	54,1	59,8	53,4	48,8	49,3	50,6	44,5	48,5	38,8	30,9	26,4	25,6	27,7	25,9	24,3
17 años	76,8	73,1	69,1	69,7	68,6	64,7	63,8	69,1	62,6	59,0	61,5	59,9	51,9	57,0	46,6	38,8	33,1	33,9	35,6	31,9	29,8
18 años	77,8	80,4	74,1	74,7	70,9	71,5	68,5	69,8	70,5	63,4	65,4	60,3	58,0	59,8	52,8	46,5	37,5	40,4	37,6	35,5	32,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Evolutivamente, en comparación con 2021 las intoxicaciones etílicas agudas se mantienen estables para el plazo temporal de alguna vez en la vida. Aumentan en 2,7 puntos porcentuales para el plazo en los últimos 12 meses (de 39,4% a 42,1%), registrándose mayor incremento entre los hombres y los estudiantes de 16 y 17 años. En el lado opuesto, se reduce su prevalencia casi en la misma proporción para los últimos 30 días (de 23,2% a 20,8%), dándose un mayor descenso entre las mujeres y, atendiendo a la edad, entre los estudiantes más jóvenes (14 años) y los más mayores (18 años).

Consumo en atracón. Binge drinking

Al comportamiento de tomar un total de 5 o más consumiciones de alcohol en una misma ocasión (en un intervalo aproximado de dos horas), se conoce como *"binge drinking"* o consumo en atracón.

Durante el año 2023, este comportamiento lo ha realizado el 28,2% de los alumnos de 14 a 18 años en el último mes. Evolutivamente, se mantiene la cifra registrada en 2021 (27,9% y 28,2%, respectivamente), si bien sigue registrándose el segundo menor resultado de la serie histórica.

Atendiendo al sexo, vemos que el consumo en atracón en el último mes es algo superior en chicos que en chicas (28,6% y 27,8%, respectivamente). Evolutivamente, en los chicos se registra un ligero repunte después de 2021, mientras que en las chicas continúa la tendencia positiva iniciada en 2019 y se registra la prevalencia de consumo en atracón más baja de la serie histórica.

Figura 1.2.4.

Prevalencia de "binge drinking" o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2014-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Lugares donde se consigue y donde se consume alcohol

Acerca de los **lugares** elegidos por los estudiantes de entre 14 a 18 años para realizar el **consumo** de esas **bebidas alcohólicas** en los 30 últimos días, cabe destacar en primer lugar los bares y pubs como la opción más señalada con un 52,8%, seguido por las discotecas con un 47,8% y las calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos con un 47,5%.

Evolutivamente, se observa la menor relevancia en esta ocasión de las casas de otras personas para el consumo de alcohol, siendo en 2021 el primer lugar elegido por los estudiantes (56,1%). Las restricciones aún vigentes por el tema de la COVID-19 en ciertos locales y hábitos de ocio seguramente tuviesen cierto impacto en la elección de los domicilios para el consumo de alcohol.

Por otro lado, dentro del mismo periodo de los últimos 30 días, los **lugares más habituales para la adquisición de bebidas alcohólicas** entre los alumnos de 14 a 18 años son los bares y pubs (54,9%), o los supermercados (54,1%) y las tiendas de barrio, chinos, quioscos o bodegas (49,4%). Entre los menores de edad, destaca su mayor limitación para la adquisición de bebidas alcohólicas y el mayor uso que hacen estos de las tiendas de barrio, chinos, quioscos y bodegas para su adquisición.

Tabla 1.2.24.

Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2023.

	Comprado/conseguido			Consumido		
	Total	14-17 años	18 años	Total	14-17 años	18 años
Supermercados	54,1	52,3	70,6	–	–	–
Bares o pubs	54,9	52,9	72,7	52,8	50,8	72,0
Discotecas	46,3	44,2	66,4	47,8	45,9	65,4
Tiendas de barrio, chinos, quioscos, bodegas	49,4	50,0	44,0	–	–	–
Hipermercados	22,0	21,2	29,8	–	–	–
Casa de otras personas	36,0	36,0	36,0	45,3	45,1	47,0
Casa donde vives	27,8	27,3	32,9	28,2	27,4	36,0
Internet	2,3	2,2	3,4	–	–	–
Venta ambulante	4,9	4,9	4,9	–	–	–
En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos	–	–	–	47,5	48,2	40,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Observando la evolución histórica en la compra del alcohol, se puede comprobar que aumenta la adquisición en discotecas con respecto a la edición anterior, pasando de un 12,8% (2021) a un 46,3% (2023). También sube la compra en bares y pubs pasando de un 48,2% (2021) a un 54,9% (2023). Esto se debe a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del COVID-19 que afectaron al ocio nocturno y que estuvieron vigentes en la primavera del 2021, momento es que se realizó el trabajo de campo de ESTUDES de dicha edición.

Tabla 1.2.25.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2023.

	Comprado/Conseguido			
	2016	2019	2021	2023
Supermercados	58,0	54,0	56,3	54,1
Bares o pubs	54,1	54,0	48,2	54,9
Discotecas	43,1	43,6	12,8	46,3
Tiendas de barrio, chinos, quioscos, bodegas	53,9	49,9	53,9	49,4
Hipermercados	27,2	21,9	21,2	22,0
Casa de otras personas	29,1	30,4	40,0	36,0
Casa donde vives	20,4	22,0	28,6	27,8
Internet	1,1	1,2	1,4	2,3
Venta ambulante	5,3	4,4	3,7	4,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Acerca de **cómo consiguen bebidas alcohólicas** los estudiantes de 14 a 18 años, lo más comentado es que son ellos mismos los que acceden a ellas. Seis de cada diez estudiantes declaran que compran/consiguen ellos directamente el alcohol, mientras que el 48,1% lo hace a través de otras personas mayores de edad.

También se puede observar que varía el modo de acceso al alcohol en función de si los estudiantes son menores de **edad** (14-17 años) o no (18 años). En este caso, el 91,5% de los estudiantes de 18 años que ha consumido esta sus-

tancia en los últimos 30 días lo han conseguido directamente, mientras que, en los menores de edad, la adquisición por medios propios baja al 56,6% y cobra más protagonismo la adquisición de bebidas alcohólicas a través de otras personas mayores (51,4%,).

Del mismo modo, se pueden observar diferencias según el **sexo**: los alumnos tienen una mayor tendencia a conseguirlos por ellos mismos (un 62,8% frente al 57,4% de ellas) mientras que acceder al alcohol a través de otras personas mayores de edad es más frecuente entre las chicas que entre los chicos (52,5% frente al 43,3%).

Tabla 1.2.26.

Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total (14-18 años)			14-17 años
	T	H	M	
Tú directamente	60,0	62,8	57,4	56,6
A través de otras personas de 18 años o mayores	48,1	43,2	52,5	51,4
A través de otras personas menores de 18 años	17,4	15,5	19,1	18,8
De otra forma	8,9	9,5	8,4	9,4

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Consumo según tipo de bebida alcohólica

Los combinados son el tipo de bebida alcohólica con mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes (22,4%), destacando en ambos sexos, aunque con mayor relevancia entre las chicas (23,0% frente al 21,9% en los chicos). En segunda posición se sitúa la cerveza/sidra, con un peso considerablemente superior entre los chicos (16,1% frente a 11,1%).

Tabla 1.2.27.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2023.

	Total	Hombres	Mujeres
Cualquier bebida alcohólica	31,6	31,5	31,7
Combinados/cubatas	22,4	21,9	23,0
Cerveza/sidra	13,6	16,1	11,1
Licores fuertes	9,8	9,9	9,7
Licores de frutas	5,7	5,6	5,8
Vino/champán	5,8	5,9	5,6
Vermú/jerez/fino	1,6	1,9	1,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Botellón

El 47,4% de los estudiantes de entre 14 y 18 años reconoce haber hecho botellón en los últimos 12 meses. Cuando se ajusta el plazo temporal a los últimos 30 días, la prevalencia baja hasta el 19,7%.

Con independencia del periodo analizado, este tipo de acción de consumo de alcohol es más frecuente en las chicas que en los chicos. Por edad, se observa que, a medida que ésta aumenta, también aumenta la presencia de jóvenes

que tienen este hábito, pero los incrementos porcentuales van disminuyendo, incluso llega a registrarse un valor negativo cuando se pasa de 17 a 18 años, debido a que la mayoría de edad les permite consumir legalmente alcohol en locales y negocios privados.

Tabla 1.2.28.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Botellón en los últimos 12 meses	Botellón en los últimos 30 días
Total	47,4	19,7
Sexo		
Hombre	44,8	18,9
Mujer	50,0	20,5
Edad		
14 años	26,6	10,9
15 años	40,9	17,4
16 años	54,9	23,4
17 años	59,6	24,1
18 años	57,8	23,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En relación con el consumo de otras sustancias psicoactivas, se observa que las prevalencias de consumo son más altas entre los estudiantes que realizaron botellón en los últimos 12 meses (tabla 1.2.29), en especial cuando se trata de tabaco y de cannabis, donde la presencia de estudiantes que han consumido esas drogas en el último año es cinco veces mayor que entre los que no han hecho botellón (47,8% *vs.* 9,2% para el tabaco, y 37,3% *vs.* 7,4% para el cannabis).

Tabla 1.2.29.

Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2023.

	Total		Hombres		Mujeres	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Tabaco	47,8	9,2	44,9	7,8	50,5	10,9
Hipnosedantes con o sin receta	18,7	11,1	12,6	7,1	24,4	15,6
Cannabis	37,3	7,4	39,9	7,8	34,9	7,0
Cocaína polvo y/o base	3,8	0,8	5,4	1,1	2,4	0,5
Éxtasis	4,1	0,5	4,9	0,7	3,2	0,3
Anfetaminas	2,1	0,4	3,2	0,5	1,2	0,3
Alucinógenos	2,3	0,4	3,2	0,7	1,5	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Motivos para beber

Divertirse es el principal motivo para consumir alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14 a 18 años (68,3%). Aunque en menor medida, también recibe un importante número de menciones el hecho de que les gusta la sensación que les proporciona. El tercer motivo para los chicos es el hecho de que el alcohol les ayuda a desinhibirse o ligar más, mientras que para las chicas cobra especial relevancia que les sirve de ayuda cuando están deprimidas.

Tabla 1.2.30.

Motivos principales por los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años beben alcohol, según sexo (%). España, 2023.

	Total		Hombres		Mujeres	
	Raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Raramente o nunca	Siempre o casi siempre
Es saludable	96,5	3,5	94,8	5,2	98,0	2,0
Para encajar en un grupo o para no sentirte excluido	92,0	8,0	91,7	8,3	92,3	7,7
Para emborracharte	87,2	12,8	88,3	11,7	86,2	13,8
Para desinhibirte o ligar más	80,6	19,4	77,9	22,1	83,0	17,0
Te ayuda cuando te sientes deprimido	75,4	24,6	81,5	18,5	70,1	29,9
Te gusta cómo te sientes	62,2	37,8	62,3	37,7	62,2	37,8
Es divertido o anima las fiestas	31,7	68,3	32,3	67,7	31,2	68,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Consumo de alcohol en padres

Existe una relación directa entre el consumo de alcohol de los estudiantes de 14 a 18 años y el que hacen sus padres y madres. En todos los períodos temporales y para todas las prácticas analizadas se observa, en general, un incremento de las prevalencias entre el alumnado a medida que se hace más frecuente el consumo de alcohol entre sus progenitores. El incremento porcentual más acentuado se da en los casos en los que el padre abusa del consumo de alcohol todos o casi todos los días.

Tabla 1.2.31.

Prevalencia de consumo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias según el consumo de alcohol que hayan realizado sus padres (%) España, 2023.

	Alcohol alguna vez en la vida	Alcohol últimos 12 meses	Borracheras últimos 12 meses	Botellón últimos 12 meses	Binge últimos 30 días
Padre					
No ha bebido ningún día	68,6	66,2	37,5	42,2	23,0
Ha bebido algún día aislado	79,0	77,0	45,4	51,4	29,9
Ha bebido solo los fines de semana	78,8	76,9	44,1	50,9	31,4
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	80,4	77,7	44,8	50,1	29,4
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	84,1	79,8	52,3	52,1	36,7
Madre					
No ha bebido ningún día	71,1	68,7	39,2	43,7	24,6
Ha bebido algún día aislado	79,8	77,6	46,1	51,7	30,4
Ha bebido solo los fines de semana	79,9	78,0	44,2	51,1	31,9
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	82,8	80,9	49,0	52,9	30,3
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	91,0	87,3	65,9	62,6	50,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Bebidas energéticas

Se ha analizado la extensión que tienen las bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster, etc.) entre los alumnos de 14 a 18 años, obteniendo que cerca de la mitad (47,7%) han tomado bebidas de este tipo en los últimos 30 días, siendo la prevalencia mayor entre los chicos que entre las chicas en 13,7 puntos porcentuales (54,4% *vs.* 40,7%).

En el grupo masculino, aunque entre los más jóvenes (14 años) ya se detecta una prevalencia considerable de estas bebidas (46,1%), se observa un importante incremento entre los de 15 años (52,4%) y pasa a estabilizarse entre los de 16, 17 y 18 años, situándose cerca, aunque sin alcanzar el 60%.

En el caso de las chicas, la prevalencia de consumo se mantiene estable con un ligero crecimiento desde los 14 a los 17 años, haciendo que la diferencia de consumo de estas bebidas respecto a los chicos alcance su máximo entre las alumnas de 16 y 17 años con casi 20 puntos. Entre las alumnas de 18 años se observa un repunte del consumo elevándose la prevalencia de estas bebidas hasta el 44,2%.

En lo que respecta a **mezclar bebidas energéticas con alcohol**, se observa que el 19,5% de los estudiantes de 14 a 18 años ha realizado este consumo en los últimos 30 días. Atendiendo al sexo, se observa que la prevalencia es similar entre los alumnos y las alumnas de 14 y 15 años, empezando a ser más habitual su consumo entre los chicos de 16 y 17 años, para atenuarse algo a los 18 años debido al repunte que se produce en el consumo de las chicas de esa edad.

Tanto en el grupo masculino como en el femenino, se observa, en general, un incremento en la prevalencia de consumo a medida que lo hace la edad, si bien, en los hombres se alcanza el máximo a los 17 años, mientras que en las chicas se incrementa hasta los 16-17 años donde se estabiliza, dándose un repunte final entre las de 18 años.

Tabla 1.2.32.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años		15 años		16 años		17 años		14-17 años		18 años	
	T	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Bebidas energéticas	47,7	54,4	40,7	46,1	39,4	52,4	39,9	58,1	41,4	57,2	41,0	54,0	40,5	59,8	44,2
Bebidas energéticas mezcladas con alcohol	19,5	20,8	18,2	12,0	12,7	16,6	17,0	24,1	20,0	26,8	20,6	20,4	17,8	26,0	23,4

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Evolutivamente, se observa que tanto para el consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol, y tanto en chicos como en chicas, las prevalencias registradas en 2023 son las mayores de toda la serie histórica.

Atendiendo al sexo, se observa que entre los alumnos se registra un mayor consumo en los últimos 30 días tanto de bebidas energéticas (de 50,7% en 2021 y 54,4% en 2023) como de bebidas energéticas mezcladas con alcohol (de 17,5% en 2021 a 20,8% en 2023), mientras que entre las alumnas se observa un crecimiento más acentuado para el consumo de este tipo de bebidas mezcladas con alcohol (de 14,6% en 2021 a 18,2% en 2023).

Figura 1.2.5.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2023.



H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabaco

Después del alcohol, el tabaco es la segunda sustancia psicoactiva con mayor prevalencia de consumo entre los alumnos de 14 a 18 años. El 33,4% de los estudiantes indica que ha fumado tabaco alguna vez en su vida, reduciéndose esta proporción hasta el 27,7% para el consumo en los últimos 12 meses, y hasta el 21,0% para el plazo temporal de los últimos 30 días (figura 1.2.6).

Evolutivamente, se mantiene la tendencia negativa iniciada en 2006, y se observa de nuevo una caída en la prevalencia de consumo del tabaco en los tres tramos temporales analizados, registrándose así los datos de consumo más bajos para esta sustancia de toda la serie histórica.

Respecto al consumo diario de tabaco en los últimos 30 días, se observa que, en 2023, la prevalencia se sitúa en el 7,5% lo que supone una caída respecto al dato de 2021 de 1,5 puntos porcentuales, registrándose, también para este indicador, el valor más bajo de toda la serie histórica.

Respecto a las edades medias de inicio en el consumo se observa una estabilización en los últimos años. Tanto el dato de la edad media de inicio en el consumo que lleva estable en los 14,1 años desde 2016, como la edad media de inicio en el consumo diario que apenas ha sufrido variación desde 2012, situándose en los 14,6 años.

Por **sexo**, se observa que el consumo de tabaco en los últimos 30 días está más extendido entre las chicas, dándose esta situación en todas las edades. La mayor diferencia se registra entre los estudiantes de 18 años con 6,8 puntos porcentuales (figura 1.2.7).

Figura 1.2.6.

Prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5	41,3	38,2	33,4
Últimos 12 meses	–	–	–	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4	34,7	35,0	30,7	27,7
Últimos 30 días	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3	26,7	23,9	21,0
Diariamente últimos 30 días	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8	9,8	9,0	7,5
Edad media de inicio consumo	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1
Edad media de inicio consumo diario	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6	14,7	14,7	14,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 1.2.7.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Por **edad**, la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días tanto entre los chicos como entre las chicas de 14 a 18 años, ve un progresivo incremento hasta llegar a un 29,8% entre los alumnos de 18 años y un 36,6% entre las alumnas de 18 años.

En el caso de los chicos, el incremento porcentual registra su máximo entre los de 15 y 16 años, y se va atenuando entre los de 17 y 18 años. En el caso de las chicas, el crecimiento porcentual se mantiene estable a lo largo de todos los años.

La **edad media** en la que se produce el primer consumo de tabaco, tanto en chicos como en chicas, es a los 14,1 años, cifras similares a las que se llevan registrando desde 2016. Desde 2006, en ambos grupos, la edad de inicio en el consumo se ha ido retrasando ligeramente.

Por su parte, la edad media de inicio en el consumo diario de tabaco también resulta semejante en chicos y chicas (14,7 y 14,6 respectivamente).

Respecto al **número medio de cigarrillos de tabaco fumados al día**, los alumnos, pese tener un porcentaje menor de fumadores diarios que las chicas, hacen un consumo más intensivo de tabaco registrándose de media un mayor número de cigarrillos fumados al día: 7,5 frente a los 6 de las chicas. En términos evolutivos, se observa un aumento tanto entre los chicos como entre las chicas en el número medio de cigarrillos fumados al día respecto a 2021, registrándose el dato más alto en los alumnos desde 2004.

En 2023 la prevalencia de consumo diario de tabaco alcanza los menores valores de toda la serie histórica y la prevalencia de consumo diario por sexo muestra un consumo similar.

Tabla 1.2.33.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio del consumo (años)*	12,9	13,2	13,0	13,1	13,1	13,2	13,0	13,1	13,2	13,4	13,5	13,5	13,5	13,7	13,8	14,0	14,1	14,2	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Edad media de inicio del consumo diario (años)	14,4	14,3	14,4	14,3	14,5	14,4	14,3	14,2	14,3	14,3	14,4	14,3	14,6	14,5	14,6	14,5	14,7	14,6	14,7	14,6	14,8	14,7	14,7	14,6
Prevalencia alguna vez en la vida (%)	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	54,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7	38,2	44,3	35,1	41,5	30,0	36,8
Prevalencia últimos 30 días (%)	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0	23,9	29,3	21,2	26,7	18,9	23,3
Prevalencia de consumo diario (%)	19,3	27,0	17,7	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0	9,4	10,3	8,8	9,2	6,9	8,1
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (%)																								
1-5	44,4	49,0	44,7	46,5	41,6	44,5	61,9	63,0	56,1	58,3	65,0	68,5	54,7	57,0	60,6	66,1	56,6	63,5	56,6	67,0	55,1	63,4	49,6	59,1
6-10	34,8	35,2	33,5	36,0	35,7	35,5	22,7	27,2	28,0	30,1	23,3	23,9	32,4	32,9	30,7	26,5	32,9	28,3	30,9	25,5	30,7	28,6	32,5	30,5
>10	20,8	15,8	21,8	17,5	22,7	20,0	15,3	9,8	15,9	11,6	11,7	7,6	12,9	10,1	8,7	7,4	10,5	8,1	12,5	7,5	14,2	8,0	17,9	10,4
Media de cigarrillos al día (nº)	7,6	6,8	7,8	7,3	8,1	7,5	5,8	5,3	5,1	5,0	5,7	4,8	6,4	6,0	5,8	5,4	6,1	5,5	6,5	5,5	6,8	5,4	7,5	6,0

H = Hombres, M = Mujeres.

* En fumadores actuales y ex-fumadores (años).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 1.2.8.

Prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombre	19,3	17,7	18,9	12,5	13,3	11,0	12,0	8,7	8,6	9,4	8,8	6,9
Mujer	27,0	24,2	24,1	16,9	16,4	13,6	13,1	9,1	9,0	10,3	9,2	8,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En relación al **tipo de cigarrillos fumados**, vemos que el 49% de los estudiantes de 14 a 18 años que ha fumado tabaco en los últimos 30 días declara que ha fumado cigarrillos tanto de cajetilla como de liar. En términos de exclusividad, es más habitual consumir sólo de cajetilla (34,5%) que sólo de liar (16,5%).

Atendiendo al sexo, vemos que entre los chicos está algo más extendido el consumo de cigarrillos de ambos tipos que entre las chicas (51,1% frente a 47,3%), donde encontramos algo más de presencia tanto de las que consumen sólo de cajetilla (35,3% frente a 33,5% entre los chicos) como sólo de liar (17,4% frente a 15,3% entre los chicos).

Tabla 1.2.34.

Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos
Total	34,5	16,5	49,0
Hombre	33,5	15,3	51,1
Mujer	35,3	17,4	47,3
14 años	38,6	13,2	48,1
15 años	36,6	12,9	50,5
16 años	35,2	15,7	49,1
17 años	31,4	19,0	49,7
18 años	35,1	19,8	45,1
14-17 años	34,4	16,1	49,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Por edades es más común fumar cigarrillos de ambos tipos, con independencia de la edad analizada. Es más habitual encontrar a alumnos que fuman sólo cigarrillos de liar a medida que aumenta la edad, a la vez que el consumo de cigarrillos sólo de cajetilla tiene mayor presencia entre los estudiantes más jóvenes.

Estudiantes que se han planteado dejar de fumar

El 28,2% de los estudiantes que ha fumado en los últimos 12 meses, no se ha planteado nunca dejar de fumar (tabla 1.2.35), cifra que se mantiene entre los que han fumado en los últimos 30 días (28,3%), y que se reduce hasta el 20,4% cuando nos centramos en los estudiantes que han fumado a diario en los últimos 30 días. Se plantean dejar de fumar más chicas que chicos.

Por el contrario, un 41,5% de los estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses han intentado dejar de fumar; reduciéndose en 2,2 puntos porcentuales la proporción entre los que han fumado en los últimos 30 días (39,3%), y hasta el 37,8% entre los que han fumado tabaco a diario en el último mes.

Tabla 1.2.35.

Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la prevalencia de consumo de tabaco y según sexo (%). España, 2023.

	Estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses			Estudiantes que han fumado en los últimos 30 días			Estudiantes que han fumado a diario en los últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado	41,5	39,1	43,4	39,3	37,3	41,0	37,8	35,0	40,2
Se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado	30,3	28,9	31,5	32,3	30,6	33,7	41,8	38,4	44,8
No se han planteado dejar de fumar	28,2	32,0	25,1	28,3	32,1	25,3	20,4	26,5	15,1

T = Total; H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Cigarrillos electrónicos

Más de la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años reconoce haber consumido alguna vez en su vida cigarrillos electrónicos (54,6%). Esto supone un incremento de 10,3 puntos porcentuales respecto al dato de 2021, y sitúa el uso de estos dispositivos en el punto más alto de la serie histórica (figura 1.2.9).

Por **sexo**, se observa un mayor incremento de la prevalencia de esta sustancia entre las alumnas (15,1 puntos porcentuales respecto al dato de 2021) que entre los alumnos (5,6 puntos porcentuales respecto a 2021), siendo la primera vez que desde que se analiza esta sustancia se registra un consumo superior entre las chicas que entre los chicos (figura 1.2.10).

Atendiendo al **sexo y la edad** (figura 1.2.11), se observa que, en ambos grupos, la prevalencia de consumo aumenta a medida que lo hace la edad, registrándose así la proporción más alta entre los de 18 años (65,8% en chicos y 66,3% en chicas).

Respecto al **contenido de los cigarrillos electrónicos**, más de la mitad de los que han consumido cigarrillos electrónicos lo han hecho sin incluir ni nicotina ni cannabis. También se observa que las mujeres consumen más cigarrillos electrónicos con nicotina que los hombres (figura 1.2.12).

Figura 1.2.9.

Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014-2023.



	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	17,0	20,1	48,4	44,3	54,6
Últimos 12 meses	–	–	37,8	22,8	46,0
Últimos 30 días	–	–	14,9	8,1	26,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 1.2.10.

Evolución de la prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2023.



	2014	2016	2019	2021	2023
Hombre	18,8	22,6	52,4	46,9	52,5
Mujer	15,2	17,5	44,5	41,7	56,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 1.2.11.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 1.2.12.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el contenido del cigarrillo electrónico y según sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Pipas de agua

El 57,9% de los alumnos reconoce haber usado pipas de agua alguna vez en la vida, entendiéndose como tal cachimbas, sishas, hookah, narguille... Esta proporción se reduce hasta el 44,8% cuando se limita su consumo a los últimos 12 meses.

Por **sexo**, vemos una prevalencia similar en el uso de pipas de agua tanto para alguna vez en la vida como en los últimos 12 meses entre los chicos y chicas de esta edad. Si bien, existe una mayor proporción de chicos que de chicas a partir de los 16 años.

Tabla 1.2.36.

Prevalencia de consumo de pipas de agua alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total	Sexo		Edad									
				14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alguna vez en la vida	57,9	59,1	56,7	40,0	39,5	50,0	49,7	63,9	60,3	72,7	69,9	75,7	73,4
Últimos 12 meses	44,8	46,2	43,4	28,1	27,0	37,1	37,4	50,0	46,4	60,2	55,4	61,1	59,2

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

De entre los que han consumido pipas de agua alguna vez en la vida, sólo el 34,1% indica que nunca ha incluido en las pipas de agua ni nicotina ni marihuana o hachís. El 8,2% asegura haber consumido las pipas de agua con cannabis, siendo este tipo de consumo más extendido entre los hombres que entre las mujeres.

Hipnosedantes

Hipnosedantes (con o sin receta médica)

En 2023, la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica entre los estudiantes de 14 a 18 años, permanece estable en el consumo esporádico (al igual que en 2021 un 19,6% de los alumnos admite haberlos probado alguna vez en la vida). La prevalencia de consumo en tramos temporales más próximos registra un aumento en las prevalencias: en los últimos 12 meses se pasa de un 13,6% en 2021 a un 14,8% en 2023, y en los últimos 30 días de un 7,5% en 2021 a un 8,2% en la actualidad.

Evolutivamente, el consumo de hipnosedantes ha ido aumentando a lo largo de toda la serie histórica en todos los tramos temporales analizados, alcanzándose en esta ocasión las prevalencias más altas desde que se lleva haciendo este estudio.

Por término medio, el primer consumo de hipnosedantes se produce a los 14,1 años, dato que se ha mantenido constante a lo largo de toda la seria histórica (figura 1.2.13).

Los hipnosedantes son unas sustancias en las que se observa una gran disparidad en la prevalencia de consumo atendiendo al sexo, y es que el consumo es mayor entre las chicas donde, una de cada cuatro reconoce haber ingerido este tipo de sustancias alguna vez en la vida (26,1%), proporción que se reduce prácticamente a la mitad entre los chicos (13,3%).

Tanto en el grupo femenino como en el masculino, la extensión del consumo de hipnosedantes (con o sin receta) aumenta a medida que lo hace la edad, por lo que la prevalencia más elevada en los diferentes tramos temporales se registra en el grupo de 18 años para ambos sexos. Así, un 36,9% de las chicas de este grupo de edad ha consumido hipnosedantes alguna vez en su vida, en comparación con el 25,3% que registran las que tienen entre 14 y 17 años, y en el caso de los alumnos un 18,7% de los de 18 años han consumido esta sustancia al menos una vez en su vida frente al 12,9% que se registra entre los de 14-17 años (tabla 1.2.37).

Evolutivamente, cabe destacar un incremento en el consumo de hipnosedantes entre las chicas, pasando de 24,1% en 2021 a 26,1% en 2023 y una reducción del mismo peso porcentual entre los chicos pasando de 15,3% a 13,3% en los dos últimos años (tabla 1.2.38).

Figura 1.2.13.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9	18,4	19,6	19,6
Últimos 12 meses	–	–	–	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8	11,6	12,5	13,6	14,8
Últimos 30 días	–	–	–	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2	5,9	6,4	7,5	8,2
Edad media de inicio consumo	–	–	–	13,8	14,0	13,8	14,3	13,9	13,7	14,0	14,1	14,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.37.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez	19,6	13,3	26,1	15,9	10,3	21,3	17,5	11,3	23,7	19,9	13,4	26,8	22,2	15,9	28,7	19,0	12,9	25,3	27,4	18,7	36,9
Último año	14,8	9,7	20,0	11,9	7,5	16,0	13,5	8,6	18,5	14,9	9,8	20,4	16,6	11,1	22,2	14,3	9,3	19,4	20,7	14,0	28,2
Último mes	8,2	5,4	11,0	6,3	4,0	8,5	7,5	4,9	10,1	8,5	5,6	11,5	9,2	6,3	12,2	8,0	5,3	10,7	11,3	7,3	15,8

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.38.

Prevalencia del consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida																								
	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	9,3	13,6	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1	14,4	21,5	15,1	21,5	15,3	24,1	13,3	26,1

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Hipnosedantes (sin receta médica)

El 9,7% de los alumnos admite que en alguna ocasión ha tomado hipnosedantes sin que se los haya recetado un médico. La prevalencia del consumo sin prescripción médica presenta una tendencia de consumo ligeramente ascendente, alcanzando el valor más elevado de los últimos años en 2021 (10,3%) y registrándose en 2023 un ligero descenso para el tramo de alguna vez en la vida (9,7%) (figura 1.2.14). En el resto de tramos temporales, sin embargo, suben ligeramente las prevalencias de consumo de estas sustancias sin receta respecto a 2021, continuando así la tendencia creciente de los últimos años.

A lo largo de la serie histórica, la edad de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta se ha mantenido entre los 14 y 15 años, siendo el promedio registrado en 2023 de 14,4 años.

Cuando se analiza el consumo de hipnosedantes sin prescripción médica previa, atendiendo al sexo y a la edad, se observa que se trata de un consumo más prevalente entre las chicas independientemente de la edad y el tramo temporal de consumo analizado (tabla 1.2.39). En el caso de alguna vez en la vida y del último año las proporciones que se registran entre las alumnas están cercan de duplicar la que se registran entre los chicos.

Tal y como ocurría con los hipnosedantes con y sin receta, en el grupo femenino y masculino el consumo de hipnosedantes, en este caso exclusivamente sin receta, adquiere mayor prevalencia a medida que aumenta la edad de los estudiantes, de modo que el mayor porcentaje de consumo se registra entre los estudiantes de 18 años para todos los tramos temporales.

Figura 1.2.14.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0	8,6	10,3	9,7
Últimos 12 meses	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4	6,1	7,2	7,4
Últimos 30 días	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6	2,9	3,6	3,8
Edad media de inicio consumo	14,5	14,6	14,8	14,4	14,3	14,2	14,6	14,2	14,0	14,3	14,4	14,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.39.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez	9,7	6,9	12,7	7,6	4,8	10,3	8,2	5,4	11,1	10,2	7,3	13,4	11,3	8,5	14,3	9,5	6,6	12,4	13,5	10,6	16,7
Último año	7,4	5,3	9,5	5,6	3,7	7,3	6,4	4,2	8,6	8,0	5,8	10,4	8,4	6,3	10,5	7,2	5,1	9,3	10,3	7,8	13,0
Último mes	3,8	3,0	4,7	2,9	2,1	3,6	3,5	2,4	4,6	4,1	3,3	5,0	4,3	3,6	5,0	3,7	2,9	4,6	5,2	4,4	6,1

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Históricamente el consumo de hipnosedantes sin receta siempre ha estado más presente en las chicas. En ellas, la prevalencia relativa al consumo alguna vez en la vida se ha mantenido en una franja entre el 7,6% y el 12,9% a lo largo de la serie, mientras que, en el grupo masculino, la cifra de consumo ha oscilado históricamente entre el 4,4% y el 8,4% (tabla 1.2.40).

En cuanto a la edad de inicio en el consumo, a lo largo de la serie se ha observado que, por término medio, los chicos que han consumido alguna vez realizaron su primer consumo antes que las chicas, situación que se repite en 2023: 14,2 edad media de inicio de consumo entre los chicos y 14,5 edad media de inicio de consumo entre las chicas.

Tabla 1.2.40.

Características del consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	14,3	14,7	14,4	14,8	14,7	14,9	13,8	14,4	13,9	14,5	13,7	14,4	14,3	14,8	13,8	14,5	13,5	14,2	14,1	14,3	14,3	14,4	14,2	14,5
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8	6,8	10,3	7,8	12,9	6,9	12,7
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7	4,7	7,4	5,1	9,4	5,3	9,5
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3	2,2	3,5	2,6	4,7	3,0	4,7



H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Analgésicos opioides

Como novedad, en la encuesta del año 2019 se incluyó la pregunta sobre el uso de analgésicos opioides para colocarse. Por ello, a diferencia de otras sustancias presentes en este estudio, sólo se tienen datos comparables de las tres últimas ediciones de la encuesta.

En 2023, el 1,8% de los estudiantes de 14 a 18 años declara haber consumido analgésicos opioides para colocarse alguna vez en su vida. Esta proporción se reduce hasta el 1,3% para el tramo temporal de los últimos 12 meses, habiendo aumentado 0,4 puntos porcentuales respecto al dato de 2021 y volviendo a niveles pre-pandemia. El consumo de esta sustancia en los últimos 30 días se sitúa en niveles muy residuales (0,6%) (tabla 1.2.41).

La **edad de inicio** de consumo se sitúa por primera vez ligeramente por debajo de los 15 años consolidando la tendencia de inicio de consumo cada vez más precoz (tabla 1.2.41).

En función del **sexo**, el consumo de esta sustancia está más extendido entre los chicos que entre las chicas en todos los tramos temporales, siendo una sustancia cuyo consumo está muy reducido en ambos colectivos y en todos los tramos temporales analizados (tabla 1.2.42).

Tabla 1.2.41.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2019-2023.

	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	2,2	1,7	1,8
Últimos 12 meses	1,5	0,9	1,3
Últimos 30 días	0,5	0,3	0,6
Edad media de inicio en el consumo	15,2	15,1	14,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.42.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides para colocarse entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2023.

	Total	Hombre	Mujer
Alguna vez en la vida	1,8	2,2	1,4
Últimos 12 meses	1,3	1,7	0,9
Últimos 30 días	0,6	0,9	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Cannabis

El cannabis es la sustancia psicoactiva ilegal con mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes de 14 a 18 años, siendo en 2023 un 26,9% aquellos que admitieron haberla consumido alguna vez en su vida (figura 1.2.15).

La prevalencia de consumo del cannabis presentó una tendencia creciente desde 1994 hasta 2004, cuando alcanzó su máximo nivel con un 42,7% que reconocía haberlo consumido en alguna ocasión. A partir de aquel año, la prevalencia de consumo comenzó una tendencia descendente, con ligeros repuntes en 2012 y 2019. En 2023, se registra la prevalencia más baja desde 1998 (26,9%).

Por término medio, el inicio de consumo de esta droga comienza antes de cumplir los 15 años (14,9), cifra que se ha mantenido sin apenas variaciones en las últimas ediciones.

Analizando el tramo temporal de los últimos 30 días, los estudiantes que confirman un consumo de cannabis representan el 15,6%. Evolutivamente, tras la tendencia ascendente que se observó entre los años 1994 y 2004, se registra una tendencia descendente, estabilizándose en 2023.

En general, el consumo de cannabis se encuentra más extendido en los chicos. Las únicas excepciones se dan entre los alumnos de 14 años donde se registran prevalencias más altas entre las chicas en todos los tramos de consumo analizados (figura 1.2.16).

Considerando el grupo masculino, el 12,2% de los estudiantes de 14 años ha consumido cannabis alguna vez, proporción que aumenta progresivamente con la edad, encontrando que, en el grupo de 16 años son 1 de cada 3 los que han consumido en alguna ocasión (30,4%), y en el grupo de 18 años el porcentaje de consumo se aproxima al 50% (47,2%).

Contemplando el grupo femenino, el 13,3% de las estudiantes de 14 años admiten haber consumido esta droga alguna vez. La proporción asciende a 2 de cada 10 en el grupo de 15 años (20,4%), y esta prevalencia se hace más del doble entre las de 18 años (44,2%).

Al considerar el tramo temporal de los últimos 30 días, tanto en el grupo masculino como en el femenino la prevalencia de consumo aumenta progresivamente con la edad.

Figura 1.2.15.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%) y edad media de inicio del consumo (años). España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1	31,1	33,0	28,6	26,9
Últimos 12 meses	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3	27,5	22,2	21,8
Últimos 30 días	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3	19,3	14,9	15,6
Diariamente últimos 30 días	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7	1,8	2,0	2,3	1,6	1,3
Edad media de inicio consumo	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8	14,9	14,9	14,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 1.2.16.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

A lo largo de la serie histórica, el consumo de cannabis siempre ha estado más extendido entre los chicos; sin embargo, a medida que pasan los años se ha ido reduciendo la diferencia por sexos. Respecto a 2021, vemos en ambos colectivos un descenso en la prevalencia de consumo para alguna vez en la vida y los últimos 12 meses, registrándose, sin embargo, un incremento en la presencia de alumnos que reconocen su consumo durante los últimos 30 días.

La edad de inicio de consumo del cannabis se sitúa para chicos y chicas en los 14,9 años, cifra que se ha mantenido estable a lo largo de la serie histórica.

Analizando la frecuencia de consumo en el último mes, lo más frecuente, tanto en chicos como en chicas, es que el cannabis se haya tomado de forma esporádica (1 o 2 días). Sólo en casos residuales, el consumo alcanza la frecuencia de 20 o más días (1,7% en alumnos y 1,0% en alumnas).

Tabla 1.2.43.

Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio de consumo (años)																								
	14,8	15,0	14,6	14,8	14,6	14,8	14,5	14,6	14,6	14,7	14,6	14,8	14,8	15,0	14,8	14,9	14,8	14,9	14,9	15,0	14,8	14,9	14,9	14,9
Prevalencia (%) alguna vez en la vida																								
	36,2	30,1	46,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9	34,5	31,5	29,2	27,9	27,6	26,2
Prevalencia (%) últimos 12 meses																								
	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	26,8	23,3	29,7	23,3	28,0	23,0	28,1	24,4	29,2	25,9	22,6	21,8	22,5	21,0
Prevalencia (%) últimos 30 días																								
	24,5	16,9	25,8	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	18,6	14,6	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9	21,5	17,3	15,7	14,1	16,7	14,5
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	75,5	83,1	74,2	80,4	71,7	78,0	77,7	82,0	74,7	82,5	80,3	84,7	81,1	86,7	83,1	87,9	84,2	88,2	82,3	86,6	87,6	89,1	89,1	90,5
1 a 2 días	8,6	8,8	8,6	9,1	9,4	9,8	7,4	7,4	7,9	7,1	6,9	6,8	7,1	6,2	6,5	6,0	5,7	5,5	7,0	6,5	5,1	5,4	4,7	4,8
3 a 5 días	4,7	3,5	4,8	3,8	4,4	4,5	5,3	4,8	5,0	4,6	3,9	3,7	3,9	3,0	3,9	2,8	3,6	2,7	3,8	3,1	2,6	2,2	2,4	2,1
6 a 9 días	3,1	1,9	3,9	2,8	3,5	2,6	2,5	1,8	2,6	1,8	2,2	1,4	2,1	1,3	2,0	1,1	1,8	1,3	1,5	1,2	1,2	1,0	1,0	0,8
10 a 19 días	3,5	1,3	3,0	1,8	3,5	2,3	2,9	1,8	3,6	2,0	2,5	1,6	2,0	1,3	1,9	1,2	1,9	1,1	2,1	1,2	1,3	1,2	1,2	0,8
20 a 29 días	4,7	1,4	5,5	2,1	7,4	2,8	4,2	2,2	4,5	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3	3,3	1,4	2,1	1,1	1,7	1,0



H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Características del consumo de cannabis: cantidad y tipo

En cuanto a la cantidad consumida, el día que un estudiante ha consumido cannabis en los últimos 30 días, ha fumado 3,4 porros de media. Los chicos realizan un consumo más intensivo de esta sustancia pues, cuando consumen, por término medio, fuman más de un porro de diferencia de lo que declaran las chicas (4,0 *vs.* 2,8 porros)

En cuanto a la forma de consumo del cannabis, vemos que todas las opciones tienen un peso similar (principalmente marihuana, principalmente hachís y de los dos tipos) entre los estudiantes de 14 a 18 años que han consumido cannabis en el último mes.

Tabla 1.2.44.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016-2023.

	2016	2019	2021	2023		
	Total	Total	Total	Total	Hombre	Mujer
Tipo de consumo de cannabis						
Principalmente marihuana (hierba)	51,1	43,8	49,8	35,2	32,2	38,7
Principalmente hachís (resina, chocolate)	12,2	19,3	16,7	30,2	31,7	28,4
De los 2 tipos	36,7	37,0	33,5	34,6	36,1	32,9
Mezcla de cannabis con tabaco						
Sí	82,4	87,1	87,7	75,7	74,4	77,2
No	17,6	12,9	12,3	24,3	25,6	22,8
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis	3,4	3,4	3,3	3,4	4,0	2,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

El 35,2% de los estudiantes que han consumido cannabis en el último mes señala que ha fumado principalmente marihuana (hierba). Esta forma de consumo, frente al hachís o resina, se encuentra más extendida entre las chicas.

Por su parte, el 34,6% de los alumnos que han consumido cannabis en los últimos 30 días reconoce un consumo tanto de marihuana como de hachís. El consumo de las dos modalidades en el mismo periodo se encuentra algo más extendido entre los chicos.

Entre los consumidores de cannabis, el 30,2% restante ha consumido principalmente hachís o resina, destacando el importante incremento que ha tenido esta forma de consumo del cannabis respecto al dato de las últimas encuestas (13,5 puntos porcentuales respecto al dato de 2021).

Por otra parte, la mayoría de los consumidores fuman cannabis mezclándolo con tabaco (75,7%). Sin embargo, destaca en esta edición el aumento de aquellos que consumen cannabis sin mezclarlo con tabaco, que ha aumentado en 12 puntos porcentuales respecto al dato de 2021.

La amplia mayoría de los estudiantes de 14 a 18 años que no han probado el cannabis declaran que no lo probarían, aunque fuese legal. En el lado opuesto, la legalidad del cannabis animaría al 12,9% a probar el cannabis, lo que supone una bajada de 5,3 puntos porcentuales respecto al dato de 2021.

Tabla 1.2.45.

Porcentaje de estudiantes de 14-18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal, entre los estudiantes de 14-18 años que no lo han probado nunca (%). España 2016-2023.

	2016	2019	2021	2023
Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías?				
Sí	12,5	15,4	18,2	12,9
No	87,5	84,6	81,8	87,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Consumo de riesgo de cannabis. Escala CAST

El consumo de cannabis se asocia con diversos efectos adversos en la salud entre los que destacan el aumento del riesgo de consumo de otras drogas y adicciones, así como los problemas de salud mental. Son importantes las reacciones agudas de la esfera cognitivo emocional, incluyendo ansiedad y problemas de atención que se relacionan con un aumento del riesgo de accidentes, por lo que su relación con accidentes de tráfico es un aspecto de especial relevancia. También se ha demostrado relación con enfermedades respiratorias, incluida el asma y efectos cardiovasculares agudos como infarto de miocardio e ictus[1,2].

El consumo de cannabis se asocia con un aumento del riesgo de padecer trastornos del comportamiento y psicosis[3,4]. Este riesgo aumenta cuanta mayor frecuencia de consumo y mayor potencia del cannabis utilizado[5]. Los datos de las incautaciones en España y Europa indican un progresivo aumento de la pureza y potencia del cannabis. También es mayor cuanto más temprano es el consumo, de manera que es cuatro veces mayor si se inicia a los 15 años (actual edad media de inicio en el consumo en España) que si se hace a los 26 años. Se estima que hasta el 8% de la incidencia de esquizofrenia en la población podría estar relacionada con el consumo de cannabis en jóvenes[6]. Incluso se ha demostrado que el consumo de cannabis de manera únicamente puntual puede producir cambios estructurales y cognitivos en el cerebro de los adolescentes[7,8,9].

Es necesario conocer el uso problemático de cannabis. Con este fin, y en el seno de un proyecto de colaboración con el EMCDDA (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías), se han venido incluyendo, desde 2006, una serie de escalas en las sucesivas ediciones de la encuesta ESTUDES (Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias), destinadas a evaluar el consumo problemático de cannabis.

En la encuesta de 2023, se ha mantenido en el cuestionario la escala CAST – Cannabis Abuse Screening Test (Legleye et al. 2007) , que ya se introdujo en la encuesta ESTUDES 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019 y 2021 lo que permite establecer una tendencia temporal.

1. Volkow N, Baker RD, Compton WM, et al. Adverse health effects of marijuana use. N Engl J Med. 2014;370(23): 2219-2227.

2. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). The health effects of cannabis and cannabinoids: The current state of evidence and recommendations for research. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/24625.

3. Gage SH, Hickman M, Zammit S. Association between cannabis and psychosis: epidemiologic evidence. Biol Psychiatry 2016; 79: 549–56.

4. Mustonen A, Niemela S, Nordstrom T, et al. Adolescent cannabis use, baseline prodromal symptoms and the risk of psychosis. Br J Psychiatry 2018; 212: 227–33.

5. Di Forti M, Quattrone D, Freeman TP, et al, and the EU-GEI WP2 Group. The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study. Lancet Psychiatry 2019.

6. Volkow ND, Swanson JM, Evins AE, DeLisi LE, Meier MH, Gonzalez R, Bloomfield MA, Curran HV, Baler R. Effects of Cannabis Use on Human Behavior, Including Cognition, Motivation, and Psychosis: A Review. JAMA Psychiatry. 2016 Mar; 73(3):292-7.

7. Orr C, Spechler P, Cao Z, et al. Grey Matter Volume Differences Associated with Extremely Low Levels of Cannabis Use in Adolescence. J Neurosci. 2019 Mar 6;39(10):1817-1827.

8. Suerken C.K., Reboussin B. A., Egan K. L., Sutfin E. L., Wagoner K. G., Spangler J., Wolfson M.; Marijuana use trajectories and academic outcomes among college students. Drug and Alcohol Dependence 162 (2016) 137–145.

9. Feeney, K.E., Kampman K. M.; Adverse effects of marijuana use. The Linacre Quarterly 83 (2) 2016, 174–178.

La escala CAST es un instrumento de cribado que consiste en 6 preguntas que buscan identificar patrones o conductas de riesgo asociadas al consumo de cannabis en el último año. Aquellos con una puntuación de 4 o más se califican como posibles consumidores problemáticos.

A lo largo del informe se utilizará esta puntuación para clasificar a los consumidores problemáticos de cannabis, aunque existen otros artículos publicados posteriormente en los que plantea la posibilidad de fijar el punto de corte cuando la puntuación obtenida para la escala CAST resulte ser de 2 o de 3[10,11,12].

Entre los estudiantes que han consumido cannabis en el último año y han contestado la escala CAST, el 69,2% presentan una puntuación 0-1 en la escala CAST, el 16,3% una puntuación 2-3 en la escala CAST y el 14,5% una puntuación mayor o igual a 4 en la escala CAST que se relaciona con un consumo problemático. En términos evolutivos, tras dos ediciones consecutivas con un incremento en el indicador relativo al consumo problemático, parece que hay un cambio de tendencia y en esta ocasión se reduce la proporción en 3,3 puntos porcentuales respecto al dato de 2021 (figura 1.2.17).

Figura 1.2.17.

Categorización de resultados de la escala CAST entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que ha consumido cannabis en el último año (%). España, 2006-2023.



CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Teniendo en cuenta el total de estudiantes de 14 a 18 años, se confirma también la menor presencia de consumidores problemáticos de cannabis con una caída de 0,6 puntos porcentuales respecto al dato de 2021 (2,4%).

Tabla 1.2.46.

Porcentaje y estimación de consumidores problemáticos de cannabis (según escala CAST) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2023.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Población de estudiantes de 14 a 18 años (en miles) con puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático)	52.468	55.025	78.572	65.239	37.238	43.844	55.387	51.788	43.429
Porcentaje entre la totalidad de estudiantes de 14 a 18 años	3,3	3,7	4,6	3,8	2,5	2,8	3,4	3,0	2,4

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

10. Legleye S., Piontek D., Kraus L.; Psychometric properties of the Cannabis Abuse Screening Test (CAST) in a French sample of adolescents. Drug and Alcohol Dependence 113 (2011) 229–235.

11. Legleye S., Kraus L., Piontek D., Phan O., Jouanne C.; Validation of the Cannabis Abuse Screening Test in a Sample of Cannabis Inpatients. Eur Addict Res 2012;18:193–200.

12. Gyepesi A., Urban R., Farkas J., Kraus L., Piontek D., Paksi B., Horvath G., Magi A., Eisinger A., Pilling J., Kokonyei G., Kun B., Demetrovics Z.; Psychometric Properties of the Cannabis Abuse Screening Test in Hungarian Samples of Adolescents and Young Adults. Eur Addict Res 2014;20:119–128.

Considerando a los estudiantes que han consumido cannabis en el último año y han contestado la escala CAST, se observa que el patrón que refleja un consumo problemático se encuentra más extendido entre los chicos (figura 1.2.18).

En cuanto a la edad, el consumo problemático se sitúa en el 12,4% de los consumidores de 14 años, se mantiene estable entre los de 15 años y aumenta 4 puntos porcentuales entre los de 16 años, edad donde alcanza el máximo entre los estudiantes menores de edad. Entre los alumnos de 18 es donde se encuentra más extendido este patrón de consumo problemático (16,6%).

Figura 1.2.18.

Categorización de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST, según sexo y edad (%). España, 2023.



CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

No se aprecian grandes diferencias por sexo en el tipo de consumo que realizan los consumidores problemáticos de cannabis (tabla 1.2.47).

Tabla 1.2.47.

Características de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥4) en la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2023.

	Total	Hombres	Mujeres
Consumo cannabis últimos 30 días			
Principalmente marihuana	13,9	16,1	11,0
Principalmente hachís	35,3	34,0	37,1
De los 2 tipos	50,8	50,0	51,8
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días			
Sí	85,0	85,1	84,9
No	15,0	14,9	15,1
Media de porros consumidos al día (nº)	6,4	7,5	5,1

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Algo más de la mitad de los estudiantes que realizan un consumo problemático de cannabis afirman consumir indistintamente, marihuana y hachís. La marihuana se encuentra algo más extendida entre los hombres sucediéndole lo propio al hachís entre las mujeres.

Con independencia del sexo, para los consumidores problemáticos, la forma más frecuente de consumir cannabis es mezclándolo con tabaco.

Donde sí se aprecia cierta diferencia por sexo es en el número de porros consumidos al día. Entre los chicos que presentan un consumo problemático de cannabis la media de porros consumidos al día es de 7,5, superando en casi 2,5 porros la cifra que se da entre las chicas (5,1). Esto muestra una mayor intensidad de consumo entre los alumnos.

Cocaína

En 2023 la proporción de estudiantes de 14 a 18 años que han consumido cocaína (polvo y/o base) alguna vez en la vida se sitúa en el 2,9%. Evolutivamente, aunque la prevalencia no presenta importantes cambios ya que parte de niveles de consumo reducidos, se rompe la tendencia decreciente que venía representando este indicador desde 2004.

En el tramo temporal de los últimos 12 meses se observa la misma situación. La prevalencia de consumo se sitúa en el 2,3%, rompiendo así la tendencia decreciente que se llevaba recogiendo desde 2006.

Figura 1.2.19.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2	2,9	2,7	2,9
Últimos 12 meses	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5	2,4	2,1	2,3
Últimos 30 días	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0	0,9	0,6	1,0
Edad media de inicio consumo	15,8	15,7	15,8	15,4	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1	15,2	15,3	15,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Atendiendo al tramo temporal de los 30 días previos a la realización de la encuesta, la prevalencia del consumo se mantiene en niveles residuales (1%), aunque también en este tramo temporal se refleja un incremento respecto al dato de 2021 parando así la evolución decreciente iniciada desde 2006.

Los estudiantes que han consumido cocaína alguna vez, por término medio, sitúan el primer consumo a los 15 años.

Hasta 2004, esta edad media se aproximaba a los 16 años, mientras que,a partir de aquel año, se ha venido situando más próxima a los 15 años.

Tal y como ocurre con el cannabis, el consumo de cocaína (polvo y/o base) se encuentra más extendido entre los chicos (tabla 1.2.48) duplicando en esta edición al porcentaje de consumidoras.

En el caso de los chicos, se registra un ligero incremento en la proporción de consumidores de cocaína alguna vez en la vida respecto al dato de 2021, frenando así la caída en el consumo de esta sustancia que se llevaba registrando desde 2014. En el caso de las chicas, la prevalencia de consumo se ha mantenido estable en el 1,9% en las últimas 3 ediciones del estudio.

Evolutivamente, desde 2014, la diferencia de consumo por sexo se ha mantenido por debajo de los 2 puntos porcentuales, si bien, en esta ocasión se observa un ligero incremento debido al repunte que se da en el consumo entre los alumnos.

Tabla 1.2.48.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo (%). España, 1994-2021.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Hombres	8,4	9,0	11,3	6,8	6,3	4,8	4,8	4,2	4,1	3,9	3,4	3,8
Mujeres	4,5	6,4	6,8	4,7	3,8	3,0	2,5	2,9	2,2	1,9	1,9	1,9



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Cocaína según forma de presentación

Aunque el consumo de cocaína entre los estudiantes de 14 a 18 años puede ser considerado como minoritario, es importante destacar las diferencias que existen en las prevalencias de consumo según el modo de presentación de esta sustancia.

En 2023, al igual que en las anteriores ediciones, la cocaína en polvo es más consumida que en forma de base para cualquiera de los tramos temporales analizados (tabla 1.2.49).

En los tramos temporales de alguna vez en la vida y los últimos 12 meses, cabe destacar que la prevalencia de consumo de cocaína, ya sea en polvo y/o base, sube respecto a 2021 en los chicos, manteniéndose en las chicas. Para el tramo temporal de los últimos 30 días, aumenta la presencia de consumidores tanto en chicos como en chicas.

A lo largo de la serie histórica, el consumo de cocaína siempre ha estado más extendido entre los alumnos. En 2023 aumenta la diferencia debido al crecimiento de consumo en todos los tramos temporales que se ha dado entre los chicos.

La edad de inicio de consumo de cocaína se sitúa para chicos y chicas en los 15 años, cifra que se ha mantenido estable en la última década.

Tabla 1.2.49.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la forma de presentación (%). España, 2023.

	Cocaína polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base
Alguna vez en la vida	2,5	1,5	2,9
Últimos 12 meses	2,0	1,2	2,3
Últimos 30 días	0,9	0,5	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.50.

Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio del consumo (años)	16,0	15,6	15,8	15,6	15,9	15,7	15,4	15,4	15,3	15,2	14,7	15,0	15,5	15,5	14,9	15,1	15,1	15,0	15,2	15,3	15,3	15,4	15,0	15,0
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida (%)	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2	3,9	1,9	3,4	1,9	3,8	1,9
Prevalencia de consumo los últimos 12 meses (%)	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6	3,2	1,7	2,7	1,5	3,2	1,5
Prevalencia de consumo últimos 30 días (%)	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5	1,3	0,6	0,9	0,3	1,5	0,5

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Éxtasis

Bajo una perspectiva histórica, la prevalencia del consumo de éxtasis alguna vez en la vida alcanzó los valores más elevados en 2000 y 2002, cuando el porcentaje de estudiantes que habían consumido alguna vez superaba el 6%. A partir de entonces, la prevalencia de esta droga fue progresivamente descendiendo, tendencia que se frenó en 2012, para retomarla con más fuerza en 2014, año en el que se alcanzó el mínimo histórico (1,2%). A partir de entonces el consumo ha ido aumentando progresivamente situándose su prevalencia en el 3,1% en 2023.

Analizando el consumo en tramos temporales más próximos vemos también un ligero crecimiento respecto a 2021, (2,2% para los últimos 12 meses y 0,9% para los últimos 30 días).

A lo largo de la serie, el promedio de edad con el que comienza el consumo de esta droga se ha situado entre los 15 y 16 años, estableciéndose en los 15,4 años en 2023.

Figura 1.2.20.

Prevalencia de consumo de éxtasis (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3	2,6	3,1	3,1
Últimos 12 meses	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6	1,9	1,8	2,2
Últimos 30 días	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6	0,7	0,6	0,9
Edad media de inicio consumo	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2	15,4	15,4	15,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tal y como pasa con el cannabis y la cocaína, el consumo de éxtasis muestra una mayor extensión entre los varones (figura 1.2.21), haciéndose más patente esta mayor extensión a medida que aumenta la edad.

Figura 1.2.21.

Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tanto en chicos como en chicas, la presencia de aquellos que han probado éxtasis alguna vez en la vida va aumentando progresivamente a medida que lo hace la edad. En ambos grupos el mayor incremento porcentual se da de los 17 a los 18 años, destacando sobre todo en el caso de los chicos donde se duplica la prevalencia (10,0% entre los de 18 años y 4,6% entre los de 17 años).

En el año 2023 se observa un ligero aumento en la prevalencia de consumo de éxtasis entre los chicos para los diferentes tramos de tiempo estudiados.

En el caso de las chicas, respecto a 2021 encontramos una menor presencia de aquellas que lo han probado en alguna ocasión, aumentando, sin embargo, la proporción de quienes lo han consumido en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días. En ambos tramos temporales la prevalencia de consumo se mantiene por debajo del 2% entre las chicas.

A lo largo de la serie, el promedio de edad con el que comienza el consumo de esta droga se ha situado entre los 15,2 y 15,9 años para los chicos y entre los 15,1 y 15,7 para las chicas, estableciéndose en esta ocasión en los 15,5 y los 15,3 años respectivamente.

Tabla 1.2.51.

Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2000-2023.

	2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021		2023	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nº encuestados	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205	21.247	20.961
Edad media de inicio del consumo (años)	15,9	15,4	15,4	15,3	15,7	15,4	15,4	15,5	15,2	15,2	15,2	15,4	15,9	15,6	15,3	15,0	15,3	15,1	15,6	15,3	15,5	15,3	15,5	15,3
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida (%)	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8	2,7	1,9	3,1	2,1	3,4	2,8	3,6	2,5
Prevalencia de consumo los últimos 12 meses (%)	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,2	1,7	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6	2,0	1,1	2,4	1,4	2,1	1,5	2,6	1,8
Prevalencia de consumo últimos 30 días (%)	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,5

H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Anfetaminas

El consumo de anfetaminas ha seguido una evolución semejante a la del éxtasis. La prevalencia ha seguido una tendencia descendente a partir de 2002, momento en el que se registró el mayor valor de la serie histórica y se registró que el 5,5% de los estudiantes había consumido anfetaminas alguna vez. En 2014 se observó la prevalencia más baja (1,4%), y desde entonces se ha mantenido por debajo del 2% con continuas oscilaciones.

Respecto a 2023, se observa un ligero aumento en las prevalencias de consumo para todos los tramos temporales analizados, si bien, registrándose en todos los casos proporciones muy reducidas. En concreto, este año se obtiene un 1,7% para el indicador de consumo de alguna vez en la vida aumentando un 0,3% respecto a la anterior edición.

Por término medio, el primer consumo se produce a los 15,1 años, edad algo más precoz que la que se registraba en 2019 y 2021, pero que está en línea con lo que se ha registrado históricamente.

Figura 1.2.22.

Prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7
Últimos 12 meses	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2	1,1	0,9	1,3
Últimos 30 días	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7
Edad media de inicio consumo	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1	15,4	15,3	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 1.2.23.

Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Salvo a la edad de 14 años, la prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida es mayor en los hombres que en las mujeres y a medida que aumenta la edad.

Alucinógenos y setas mágicas

En 2023, y al igual que ocurre con las anfetaminas y el éxtasis, se registra un ligero repunte en el consumo de estas sustancias, si bien, manteniendo en todos los tramos temporales cifras de prevalencias de consumo muy minoritarias entre los estudiantes de 14 a 18 años.

El consumo de este tipo de sustancias registró la mayor extensión de la serie histórica en 1996, cuando el 6,8% de los estudiantes de 14 a 18 años admitió haber consumido alguna vez. Entre 1998 y 2000, la prevalencia se situó por debajo del 6%, entre 2002 y 2008, por debajo del 5%, y entre 2010 y 2012, por debajo del 4%. Desde 2014 esta tendencia prosigue, registrándose un porcentaje inferior al 2% en 2023.

En línea con esta evolución, la extensión del consumo referida a los últimos 12 meses y a los últimos 30 días se encuentra por debajo del 1,5% (1,3% y 0,5% respectivamente).

La edad media de inicio en el consumo se sitúa en 15,1 años, similar a los valores registrados a lo largo de la serie a excepción de 2014 momento en el que se registró el consumo más precoz (14 años).

Figura 1.2.24.

Prevalencia de consumo de alucinógenos (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6	1,9	1,7	1,9
Últimos 12 meses	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0	1,4	1,0	1,3
Últimos 30 días	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4	0,5	0,3	0,5
Edad media de inicio consumo	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2	15,2	15,6	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En 2023 la prevalencia de consumo de **setas mágicas** se sitúa en el 1,5% para alguna vez en la vida, 1,1% en los últimos 12 meses y 0,5% en los últimos 30 días (figura 1.2.25).

En términos evolutivos, las prevalencias registradas en 2023 son similares, aunque algo superiores, a las registradas en 2021 con una tendencia estable desde 2014.

Figura 1.2.25.

Prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%) y edad media (años) de inicio en el consumo. España, 2010-2023.



	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	2,1	2,2	1,3	1,4	1,7	1,3	1,5
Últimos 12 meses	1,6	1,4	0,8	0,9	1,1	0,8	1,1
Últimos 30 días	0,7	0,6	0,4	0,3	0,4	0,2	0,5
Edad media de inicio consumo	–	–	–	15,0	15,2	15,5	15,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Heroína

El porcentaje de consumidores de heroína entre los estudiantes de 14 a 18 años se sitúa por debajo del 1% con independencia del tramo temporal analizado. Desde que se tienen datos del estudio, en ninguna medición se ha superado esta cifra (figura 1.2.26).

La edad media de inicio de consumo en 2023 es de 14,1 años, algo más precoz que en las dos ediciones previas de la encuesta ESTUDES.

El 96,2% de los estudiantes opina que el consumo habitual de heroína puede producir muchos o bastantes problemas para la salud, lo que muestra el amplio consenso que hay entre los estudiantes de 14 a 18 años acerca del riesgo percibido de su consumo (figura 1.2.27).

Por otro lado, 2 de cada 10 alumnos piensan que les sería fácil conseguir esta sustancia, proporción que aumenta en 3,5 puntos porcentuales la que se registraba en 2021 y que rompe la tendencia descendente que se venía registrando desde 2010 acerca de la facilidad percibida para obtener esta sustancia.

Figura 1.2.26.

Prevalencia de consumo de heroína (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8	0,7	0,5	0,7
Últimos 12 meses	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5
Últimos 30 días	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4
Edad media de inicio consumo	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0	14,5	14,7	14,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 1.2.27.

Percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y percepción de disponibilidad de heroína (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir heroína si quisiera) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2023.España, 2000-2023.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Riesgo percibido consumo habitual	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5	96,4	97,3	97,0	96,2
Disponibilidad	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4	21,2	20,2	16,3	19,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Inhalables volátiles

Cuando se alude a los inhalables volátiles en el cuestionario, también se indican otros términos como “colas”, “pegamentos”, “disolventes”, “poppers”, “nitritos” o “gasolina”.

Aunque el consumo de inhalables volátiles no está muy extendido entre los estudiantes de 14 a 18 años, el porcentaje que admite haber tomado este tipo de sustancias alguna vez en la vida se ha incrementado alcanzando un 2,8% de prevalencia y continuando así la tendencia creciente iniciada desde 2014 y que sitúa la proporción de consumo en niveles similares a los de 2008.

Figura 1.2.28.

Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0	1,7	1,8	2,8
Últimos 12 meses	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6	1,0	1,1	2,1
Últimos 30 días	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5	0,4	1,0
Edad media de inicio consumo	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8	14,5	14,9	15,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En el tramo temporal de los últimos 12 meses, también ha aumentado el consumo de estas sustancias, superando la barrera del 2%, algo que no sucedía desde al año 2004, cuando se registró una prevalencia del 2,2%.

Para el tramo temporal de los últimos 30 días también se registra un incremento en la prevalencia, si bien se sigue sin superar el 1% lo que muestra una presencia residual de consumidores continuados de este tipo de sustancias entre los estudiantes de 14 a 18 años.

Salvo a la edad de 14 años, la prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida es mayor en los hombres que en las mujeres y a medida que aumenta la edad.

Figura 1.2.29.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

GHB

El consumo de GHB (gamma-hidroxibutirato) no supera el 1% entre los estudiantes de 14 a 18 años, siendo el porcentaje que admite haber consumido este tipo de sustancias alguna vez en la vida del 0,7%, cifra inferior para el último año y los últimos 30 días (figura 1.2.30).

Figura 1.2.30.

Prevalencia de consumo de GHB (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2023.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6	0,6	0,4	0,7
Últimos 12 meses	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4	0,3	0,5
Últimos 30 días	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3
Edad media de inicio consumo	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8	14,2	14,4	15,0	14,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Evolutivamente, desde 2012 se observa un descenso en la proporción de alumnos que ha consumido GHB en los indicadores temporales, valores que se han estabilizado en 2023, pero que sigue situando las prevalencias de consumo de esta sustancia en niveles inferiores a los que se registraban hace una década. El consumo, en todos los tramos temporales, es mayor en los hombres que en las mujeres.

El primer contacto con el GHB se ha situado históricamente entre los 14 y 15 años, estableciéndose en los 14,7 años en 2023.

Metanfetaminas

La metanfetamina también se conoce como "meth", "ice" o "cristal". Hasta 2014, la metanfetamina estaba incluida en la encuesta ESTUDES dentro del módulo de nuevas sustancias, pero desde el año 2016 se pregunta de forma independiente.

En 2023, la prevalencia se ha mantenido estable en el 1,5% en aquellos que han consumido alguna vez en la vida, incrementándose muy ligeramente respecto al año 2021 en el último año (1,1% *vs.* 0,9% en 2021) y en los últimos 30 días (0,6% *vs.* 0,3% en 2021). Siendo un consumo muy residual, en 2023 se registra la prevalencia más alta de la serie histórica en el tramo temporal del último mes.

Figura 1.2.31.

Prevalencia de consumo de metanfetamina (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2010-2023.



	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	0,8	0,9	0,8	1,4	1,6	1,5	1,5
Últimos 12 meses	0,6	0,7	0,5	1,0	1,2	0,9	1,1
Últimos 30 días	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,6
Edad media de inicio consumo	–	–	–	15,1	15,2	15,4	15,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Esteroides anabolizantes

El porcentaje de consumidores de esteroides anabolizantes se sitúa por debajo del 1% entre los estudiantes de 14 a 18 años en todos los tramos temporales.

Figura 1.2.32.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2012-2023.



	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alguna vez en la vida	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6
Últimos 12 meses	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4
Edad media de inicio consumo	–	–	14,3	14,5	14,4	14,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio

Es importante considerar que el módulo de preguntas sobre el uso de sustancias estimulantes para mejorar su rendimiento en el estudio se introdujo en 2016, incluyendo: metilfenidato, Elvanse®, Adderall®, piracetam, aniracetam, donepezilo, modafinilo, Durvitan®, anfetaminas, speed y cocaína. Al igual que en 2019 y 2021, en la edición de 2023 no se incluyeron dentro de este módulo otro tipo de sustancias estimulantes sí incluidas en 2016, tales como: refrescos de cola, café, té, complejos vitamínicos, bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster…), productos que contienen: ginkgo biloba, guaraná, ácidos grasos omega 3, jalea real, acetil L-carnitina (ALC), fosfatidilserina…).

Entre los estudiantes de 14 y 18 años, el 7,3% afirma haber consumido alguna vez en la vida sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio, siendo un comportamiento algo más común entre las chicas (7,6%) que entre los chicos (6,9%).

Evolutivamente, se observa que se ha obtenido la cifra más alta de las tres ediciones, registrándose un aumento de 0,8% puntos porcentuales respecto al dato obtenido en 2021. Este incremento se ha dado en la misma proporción entre los alumnos y alumnas de 14 a 18 años (figura 1.2.33).

Analizando pormenorizadamente cada una de las sustancias estimulantes, vemos que entre los alumnos que las han tomado, lo más común es consumir cocaína (23,4%), metilfenidato (18,9%) y anfetaminas o speed (15,3%).

Con respecto a 2021, cabe destacar que el consumo de las anfetaminas o speed como estimulante se ha reducido ligeramente entre los estudiantes, aumentando el consumo de la cocaína y la del metilfenidato (tabla 1.2.52).

Figura 1.2.33.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2019-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.52.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido este tipo de sustancias estimulantes alguna vez en la vida (%). España, 2016-2023.

	2016	2019	2021	2023
Cocaína	24,4	25,0	22,2	23,4
Metilfenidato (Concerta®, Rubifen®, Medikinet®, Equasym®, Medicebran®, Ritalín®)	18,0	20,7	17,2	18,9
Anfetaminas o speed (anfetas, metanfetamina, ice)	15,6	16,6	17,8	15,3
Piracetam (Nootropil®, Ciclofalina®, Anacervix®), Aniracetam	11,3	10,6	13,6	13,9
Lisdexanfetamina dimesilato (Elvanse®), dextroanfetamina (Adderall®)	7,8	9,5	8,1	8,7
Donepezilo (Aricept®, Donebrain®)	6,9	6,2	7,3	6,2
Cafeína (Durvitan®)	8,4	5,9	7,5	6,9
Modafinilo (Modiodal®, Provigil®)	7,6	5,5	6,2	6,7

* Calculado sobre los estudiantes que han consumido alguna vez en la vida sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Nuevas sustancias psicoactivas

A través de este apartado se pretende conocer la prevalencia de consumo de las llamadas nuevas sustancias psicoactivas (NSP) entre los estudiantes de 14 a 18 años. Las drogas incluidas en este grupo son: ketamina, spice, mefedrona, salvia, ayahuasca, y como novedad este año se han incluido en este bloque de nuevas sustancias el óxido nitroso (gas de la risa) y el cloretilo.

La prevalencia de consumo de todas estas “nuevas sustancias” alguna vez en la vida es del 3,7% (4,5% en los alumnos y 2,8% en las alumnas). Por ello, se puede ver que se produce un incremento en este indicador provocado por la inclusión de estas dos nuevas sustancias ya que el consumo del resto de sustancias maneja valores similares al de la anterior edición. En concreto se obtienen prevalencias del 1,5% para el óxido nitroso y del 1,2% para el cloretilo.

La prevalencia de consumo de NSP alguna vez en la vida permanece estable desde 2010 y por debajo del 1,6%.

Figura 1.2.34.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2014-2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 1.2.35.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2023.



	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Ketamina	1,1	1,1	0,7	0,6	0,6	0,7	1,0
Spice (cannabinoides sintéticos)	1,1	1,4	0,8	0,9	0,6	0,6	0,9
Ayahuasca	–	–	–	–	0,4	0,4	0,6
Mefedrona (catinonas sintéticas)	0,4	0,5	0,5	0,5	0,8	0,3	0,5
Salvia divinorum		0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,5
Óxido nitroso	–	–	–	–	–	–	1,5
Cloretilo	–	–	–	–	–	–	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Policonsumo

El policonsumo hace referencia al consumo de diversas sustancias psicoactivas (de carácter legal y/o ilegal) en un mismo periodo de tiempo.

Considerando los **12 meses previos** a la realización de la encuesta, el 36,4% de los estudiantes realizó algún tipo de policonsumo, es decir, consumió dos o más sustancias diferentes en este periodo, mientras que el 40,4% consumió una única sustancia. Así, los estudiantes que no realizaron ningún consumo de drogas representan el 23,3% de los alumnos (tabla 1.2.53).

Si se contemplan los **últimos 30 días**, aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes realizó policonsumo, observándose que más de la mitad de estos estudiantes consumió dos sustancias distintas en dicho periodo. En este tramo temporal, lo más frecuente es no haber consumido ninguna sustancia que supone el 38,9% de los alumnos de 14 a 18 años, seguido de haber tomado una única sustancia (35,4%).

Tabla 1.2.53.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	19,9	23,3	38,9
Una sola sustancia	36,5	40,4	35,4
Dos sustancias	18,3	16,7	13,9
Tres sustancias	15,4	12,7	9,0
Cuatro o más sustancias	9,9	7,0	2,9

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Si se compara el policonsumo en el tramo de los **12 meses previos** a la encuesta en las seis últimas encuestas, vemos que este 2023 se sitúa en el nivel más bajo de la serie (36,4%), continuando así con la tendencia descendente iniciada en 2021.

Tabla 1.2.54.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2023.

	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Ninguna sustancia	16,8	21,0	21,7	21,5	26,3	23,3
Una sola sustancia	38,9	39,1	36,7	35,7	36,1	40,4
Dos sustancias	20,1	17,7	18,1	17,7	16,8	16,7
Tres sustancias	17,5	16,7	17,5	18,2	14,5	12,7
Cuatro sustancias o más sustancias	6,7	5,5	6,1	6,9	6,4	7,0
Policonsumo (2 o más drogas)	44,3	39,9	41,7	42,8	37,7	36,4

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Si únicamente se consideran las **drogas ilegales** (cannabis, cocaína en polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, inhalables volátiles y GHB), se percibe que el policonsumo es minoritario entre los estudiantes: El 5,4% de los alumnos ha consumido a lo largo de su vida dos o más sustancias ilegales diferentes (tabla 1.2.55).

En cuanto a la prevalencia de las drogas ilegales, se observa que el 27,6% de los estudiantes ha consumido alguna sustancia ilegal en su vida, reduciéndose esta proporción hasta el 15,8% cuando se consideran los 30 días previos a la realización de la encuesta.

Tabla 1.2.55.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	72,4	77,9	84,1
Una sola sustancia	22,2	18,0	13,7
Dos sustancias	2,5	2,0	1,2
Tres sustancias	1,1	0,8	0,3
Cuatro o más sustancias	1,8	1,3	0,6

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Evolutivamente hablando, aunque se mantiene por debajo del 5%, este 2023 se registra un ligero aumento en la presencia de estudiantes que han realizado policonsumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses (4,1%), volviendo a niveles que se registraban en 2012 (tabla 1.2.56).

En el lado opuesto, vemos que este 2023 es el año en el que la proporción de estudiantes que no ha consumido ninguna droga ilegal en este periodo alcanza su máximo desde 2012 (77,9%), superando incluso el buen resultado alcanzado en 2021.

Tabla 1.2.56.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2023.

	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Ninguna sustancia	73,2	74,1	73,8	72,3	77,7	77,9
Una sola sustancia	22,7	22,9	23,2	24,2	19,3	18,0
Dos sustancias	1,6	1,5	1,4	1,8	1,5	2,0
Tres sustancias	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8
Cuatro o más sustancias	1,7	0,8	1,0	0,9	0,8	1,3
Policonsumo (2 o más drogas)	4,1	3	3	3,4	3	4,1

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

La prevalencia del policonsumo es mayor entre las chicas en todos los tramos temporales (tabla 1.2.57). También se observa que la proporción de estudiantes que no ha consumido ninguna droga en los diferentes tramos temporales analizados es mayor en el colectivo masculino. Para contextualizar este resultado, cabe recordar que las chicas registraban mayores consumos y más prevalentes que los alumnos, en las sustancias legales, tabaco y alcohol, así como en los hipnosedantes, mientras que el consumo de drogas ilegales estaba más extendido, en general, entre los chicos.

Respecto a las sustancias ilegales (tabla 1.2.58), el policonsumo es un comportamiento más frecuente entre los chicos con independencia del tramo temporal analizado.

Tabla 1.2.57.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Ninguna sustancia	22,5	17,4	26,1	20,4	41,9	35,8
Una sola sustancia	38,5	34,6	41,6	39,1	34,7	36,1
Dos sustancias	16,2	20,4	14,1	19,2	12,3	15,5
Tres sustancias	14,2	16,5	11,7	13,7	8,3	9,7
Cuatro o más sustancias	8,6	11,2	6,4	7,6	2,9	2,9

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.58.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2023.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Ninguna sustancia	71,7	73,1	77,1	78,7	83,1	85,2
Una sola sustancia	22,3	22,2	18,0	17,9	14,3	13,1
Dos sustancias	2,5	2,5	2,1	1,9	1,3	1,2
Tres sustancias	1,2	1,0	0,9	0,7	0,4	0,3
Cuatro o más sustancias	2,3	1,2	1,8	0,8	0,9	0,3

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Percepciones y opiniones de la población ante el consumo de sustancias psicoactivas

Percepción de riesgo

La percepción de riesgo da idea de en qué medida los estudiantes piensan que una determinada conducta puede ocasionar problemas. En este sentido, el riesgo asociado al consumo de drogas se comporta como un elemento protector frente al consumo y constituye un freno a la hora de que los estudiantes se planteen consumir este tipo de sustancias psicoactivas.

Existe un amplio consenso entre los alumnos en relación al riesgo que trae consigo el **consumo habitual** de sustancias como la heroína, la cocaína en polvo o el éxtasis. Así, prácticamente la totalidad de los estudiantes creen que consumir estas drogas una vez por semana o más, tiene graves consecuencias (percepción que apenas ha cambiado en todo el período analizado). A lo largo de toda la serie histórica las mujeres tienen una mayor percepción de riesgo que los hombres para todas las drogas analizadas.

En relación con el alcohol, se observa que la percepción de riesgo asociada a su consumo ha aumentado en 2023, a pesar del aumento que ha registrado su prevalencia de consumo entre los alumnos de 14 a 18 años: el 63,4% de los estudiantes de 14 a 18 años considera que tomar 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana puede

causar muchos o bastantes problemas, proporción que resulta 6,5 puntos superior a la obtenida en 2021, y es la mayor que se registra de toda la serie histórica (tabla 1.2.59).

Tabla 1.2.59.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Heroína	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5	96,4	97,3	97,0	96,2
Cocaína en polvo	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	96,6	96,9	96,4	97,1	96,8	96,0
Éxtasis	95,5	96,7	97,2	97,0	96,1	95,9	96,5	96,9	96,2	96,9	96,7	95,9
Tabaco (un paquete diario)	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7	91,8	93,8	93,9	93,4
Hipnosedantes	87,4	88,7	89,7	87,5	86,6	85,5	89,5	88,6	87,7	90,7	88,6	88,4
Cannabis	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8	90,7	87,5	88,7	92,7
Tomar 5 o 6 cañas/copas en fin de semana	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3	56,1	60,3	56,9	63,4
Tomar 1 o 2 cañas/copas diariamente	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8	52,9	57,6	57,7	63,6



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Por otro lado, el consumo diario de alcohol (tomar 1 o 2 cañas/copas cada día) es considerado peligroso por el 63,6% de los estudiantes, proporción que es superior en 5,9 puntos a la registrada en 2021 y que vuelve a ser la mayor que se registra desde que se lleva haciendo el estudio.

Siguiendo con las sustancias legales, el riesgo percibido ante el consumo diario de tabaco ha seguido una tendencia creciente a lo largo de los años. Entre los años 1994 y 2004, el porcentaje que consideraba problemático fumar un paquete de tabaco al día se aproximaba al 80% mientras que, a partir de 2006, este valor se ha ido situando próximo al 90%, superándolo de forma recurrente a partir de 2016 situándose en esta ocasión en el 93,4% muy próximo a la cifra más alta de la serie histórica que se alcanzó en 2021 (93,9%).

El consumo habitual de hipnosedantes registra una percepción de riesgo algo más baja que el consumo de un paquete de tabaco diario. El 88,4% de los estudiantes de 14 a 18 años advierte un peligro cuando se alude al consumo habitual de hipnosedantes, proporción que a lo largo de la serie histórica se ha mantenido entre el 85% y el 90%.

En cuanto a la sustancia ilegal más extendida, el cannabis, el 92,7% de los estudiantes opina que su consumo habitual puede conllevar problemas. Evolutivamente siempre se ha mantenido en cifra cercanas al 90%, si bien, sí que se observa una mayor concienciación acerca de los riesgos de su consumo respecto a 2021 (4 puntos porcentuales), y que coincide con la menor prevalencia de consumo obtenida en esta ocasión.

Al igual que ocurría con el consumo habitual, la gran mayoría de los alumnos opina que **consumir de manera esporádica** sustancias como la cocaína, éxtasis, metanfetaminas, anfetaminas, alucinógenos o la heroína puede causar muchos o bastantes problemas de salud o de otro tipo (tabla 1.2.60).

En lo que respecta al cannabis, cerca de dos tercios de los estudiantes piensa que el consumo esporádico de esta sustancia podría causar problemas a la salud u otro tipo de problemas, proporción que aumenta en 11,8 puntos respecto a la observada en 2021 y que es la más alta desde 2006.

Por último, observamos como el riesgo percibido del uso esporádico de cigarrillos electrónicos es el más bajo de los analizados (38,8%). Sin embargo, cabe destacar que ha duplicado el que se registraba en 2019 y ha aumentado en 16,4 puntos porcentuales el dato de 2021, dándose la percepción de riesgo más alta para esta sustancia desde que se pregunta por ella en ESTUDES.

Tabla 1.2.60.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2006-2023.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Fumar cannabis alguna vez	70,2	54,8	50,4	52,6	54,9	54,1	51,9	52,2	64,0
Fumar cigarrillos electrónicos	–	–	–	–	–	34,2	18,3	22,4	38,8
Consumir cocaína en polvo alguna vez	90,8	81,4	79,6	81,4	86,1	78,1	81,3	79,2	82,0
Consumir cocaína base alguna vez	90,5	86,0	82,3	83,3	85,6	82,8	84,8	83,0	84,5
Consumir éxtasis alguna vez	91,3	85,0	82,6	84,9	87,1	80,3	83,7	81,0	83,0
Consumir anfetaminas alguna vez	91,0	85,1	82,6	84,9	87,3	80,4	84,7	82,4	84,1
Consumir alucinógenos alguna vez	90,3	84,8	80,5	82,6	86,5	80,3	82,1	79,4	83,1
Consumir heroína alguna vez	92,0	86,8	84,9	87,2	88,7	82,3	86,8	85,0	86,1
Inyectarse drogas alguna vez	92,9	88,9	87,7	90,7	94,0	88,7	89,6	88,5	89,1
Consumir GHB alguna vez	91,9	86,1	83,7	85,8	87,8	88,1	88,1	85,9	–
Consumir metanfetamina alguna vez	–	–	–	–	–	85,9	87,0	84,8	86,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Percepción de disponibilidad

La disponibilidad percibida de drogas contempla en qué medida los estudiantes consideran que es difícil o fácil conseguir las diferentes sustancias psicoactivas. Respecto a la pasada encuesta, se aprecia que la percepción de disponibilidad de las sustancias legales y del cannabis ha disminuido ligeramente, sucediendo lo opuesto para las sustancias ilegales cuyo consumo está mucho más contenido.

El alcohol y el tabaco son, con diferencia, las sustancias más accesibles para los estudiantes de 14 a 18 años. En este sentido, aproximadamente 9 de cada 10 no aprecian ninguna dificultad para conseguir bebidas alcohólicas o tabaco, escenario que apenas ha cambiado a lo largo de la serie histórica (tabla 1.2.61). Esta situación pone de manifiesto que las sustancias de comercio legal se perciben totalmente al alcance de los estudiantes que quieran adquirirlas, cuando no deberían ser accesibles para los menores de 18 años.

Por otro lado, el 43,4% de los estudiantes percibe un fácil acceso a los hipnosedantes. La percepción de fácil disponibilidad de estas sustancias se ha reducido con respecto a 2021, y continúa así la tendencia descendente que se lleva registrando desde 2010. Se alcanza así la cifra más baja se la serie histórica sobre disponibilidad percibida de hipnosedantes entre los alumnos de 14 a 18 años.

Tabla 1.2.61.

Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 2000-2023.

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Alcohol	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9	91,4	93,0	94,9	93,9	92,9
Tabaco	–	–	–	91,7	90,9	93,6	92,8	90,8	91,4	93,1	91,6	89,1
Cannabis	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3	65,9	68,1	61,1	56,9
Hipnosedantes	67,2	67,6	67,3	58,9	55,6	64,0	53,3	49,1	47,5	47,4	46,7	43,4
Cocaína polvo	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	33,8	28,9	32,3	32,8	26,8	28,8
Cocaína base	–	–	–	36,1	31,8	37,0	33,4	29,5	22,9	21,8	17,4	19,9
Anfetaminas	40,2	45,4	41,7	32,1	28,1	32,5	28,7	24,2	23,4	22,8	19,1	21,4
Alucinógenos	41,4	45,3	41,9	33,7	28,6	35,8	30,9	26,2	22,8	24,1	19,9	22,1
Éxtasis	43,8	50,0	45,1	31,2	26,6	29,9	26,2	21,8	21,8	21,0	19,6	21,9
Heroína	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4	21,2	20,2	16,3	19,8
GHB	–	–	–	–	25,5	22,4	25,8	22,3	18,7	14,2	12,6	10,5
Metanfetamina	–	–	–		–	–	–	–	18,4	18,5	15,9	19,0



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

El cannabis es, con diferencia, la droga ilegal que se considera más accesible y algo más de la mitad de los alumnos piensan que es el fácil de adquirir (56,9%). Al igual que en el caso de los hipnosedantes, la facilidad de obtención se reduce en 4,2 puntos porcentuales respecto a 2021, mejorando así el buen resultado registrado hace dos años y que permite situar la disponibilidad percibida para esta sustancia en el valor más bajo de toda la serie histórica.

El porcentaje de estudiantes que opina que puede conseguir cocaína en polvo sin problemas se mantiene por debajo del 30% (28,8%), aunque supone un aumento de 2 puntos porcentuales respecto a 2021, momento en el que se alcanzó el mínimo histórico de esa sustancia en relación a su facilidad de obtención.

Los alucinógenos, el éxtasis, las anfetaminas, la heroína y las metanfetaminas son las sustancias menos accesibles según los estudiantes: entre el 78% y el 81% de los alumnos piensa, en 2023, que es complicado adquirir este tipo de sustancias. Aunque, en general, a lo largo de la última década ha ido descendiendo la percepción de disponibilidad, cabe destacar el repunte en facilidad de obtención registrado en todas ellas en los dos últimos años, siendo éste acentuado en el caso de la heroína y de las metanfetaminas. Esta mayor disponibilidad percibida está en línea con los repuntes en consumo que se han detectado para estas sustancias este 2023.

En términos generales, cobra relevancia que, a excepción del cannabis, todas las drogas ilegales incrementan ligeramente su percepción de disponibilidad mientras que todas las drogas legales descienden en dicha percepción.

Vías de información sobre sustancias psicoactivas

En el año 2023, el 29,6% de los estudiantes de 14 a 18 años cree estar perfectamente informado sobre las drogas. Atendiendo al sexo vemos que este porcentaje varía notablemente: El 26,2% de las chicas piensa que están bien informadas, frente al 33% de los chicos.

Evolutivamente, ha aumentado el porcentaje de alumnos que se sienten perfectamente informados en 7,1 puntos en esta edición respecto a 2021, produciéndose este aumento tanto en chicos como en chicas, y registrándose entre éstas la cifra más alta desde 2016.

Tabla 1.2.62.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo (%). España, 2016-2023.

	2016		2019		2021		2023	
	Perfectamente informado	Mal informado	Perfectamente informado	Mal informado	Perfectamente informado	Mal informado	Perfectamente informado	Mal informado
Total	31,3	7,5	26,0	7,1	22,5	9,3	29,6	7,9
Hombre	37,1	7,3	32,0	7,1	26,9	9,5	33,0	9,2
Mujer	25,5	7,6	20,4	7,2	18,0	9,1	26,2	6,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Viendo ahora el papel que tiene el **centro escolar** en la educación sobre el consumo de drogas y los problemas asociados en los alumnos, vemos que el 85,4% de los estudiantes indica que en su centro educativo ha recibido información, o se ha tratado el tema, siendo una cifra muy similar la que se da entre chicas y chicos.

Respecto al papel de las **familias**, vemos que el 71,5% de los estudiantes indica que ha recibido este tipo de información en el entorno familiar, siendo las chicas las que manifiestan recibir más educación acerca de este tema (74,2% *vs.* 68,8% de los chicos).

Tabla 1.2.63.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según sexo (%). España, 2023

	Total	Hombre	Mujer
He recibido información en el centro educativo	85,4	86,6	84,4
He recibido información en mi familia	71,5	68,8	74,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Los temas de los que en mayor medida han recibido formación los estudiantes de 14 a 18 años en sus centros educativos son los problemas asociados con el mal uso de las nuevas tecnologías y con el consumo de drogas legales (74,0% y 72,3%, respectivamente). En el lado opuesto, son tan sólo el 48,4% de los estudiantes aquellos que manifiestan que se les ha informado de los efectos y los problemas asociados al juego *online* y a las apuestas (tabla 1.2.64).

Por sexo, cabe destacar que las chicas tienen mayor consideración que los chicos acerca de los temas que se trataron en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones y los problemas asociados.

Tabla 1.2.64.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones, según sexo (%) España, 2023.

	Total	Hombre	Mujer
Efectos y problemas asociados a drogas legales	72,3	67,7	77,0
Efectos y problemas asociados a drogas ilegales	66,8	64,2	69,5
Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías	74,0	68,3	80,0
Efectos y problemas asociados al juego online, apuestas	48,4	46,8	50,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

Respecto a las posibles medidas que pueden ser efectivas para resolver el problema de las drogas (figura 1.2.36), prácticamente todos los alumnos coinciden en la importancia de la educación en las escuelas (95,9%) y el tratamiento voluntario a consumidores (94,9%).

Otras medidas que también son muy populares entre los estudiantes son, el control policial y aduanero (92,9%), el tratamiento obligatorio a los consumidores (91,0%) y la administración médica de metadona (90,0%). En el lado opuesto, las acciones en las que se tiene menos confianza para resolver el problema de las drogas son las relativas a la legalización, tanto exclusivamente del cannabis (50,5%) como de todas las drogas (33,8%).

Evolutivamente, vemos un aumento de confianza en la administración médica tanto de metadona como de heroína en los dos últimos años, recibiendo esta última medida la valoración más alta desde 2012 (84,6%).

Después de varias ediciones en las que se registraba una cada vez menor consideración por parte de los estudiantes sobre la legalización del cannabis y de todas las drogas como posible solución, este 2023 se frena la caída y se registra un aumento en la consideración de ambas acciones respecto a 2021. En este sentido la legalización del cannabis pasa a ser una acción muy importante para el 30,4% de los alumnos (28,4% en 2021) y de todas las drogas para el 22,7% (17,3% en 2021) (tabla 1.2.65).

Teniendo en cuenta el sexo, vemos que en el caso de la legalización del cannabis el incremento se ha dado más entre las chicas que entre los chicos, lo que hace que el porcentaje de estudiantes que confía en esta medida se sitúe en torno al 30% para ambos colectivos. Por edad, es entre los de 14 años donde se registra un aumento mayor de la confianza en esta acción.

En cuanto a la legalización de todas las drogas, aunque en menor medida que en el caso el cannabis, también se registra un mayor impacto de la mayor valoración de la acción entre las chicas que entre los chicos. Se mantiene, así, el mayor apoyo que han dado históricamente las chicas a esta propuesta. Por edad, es entre los alumnos más jóvenes (14 años) y los que han iniciado su mayoría de edad (18 años) donde se observa el mayor aumento de la confianza en la legalización de todas las drogas como posible solución al problema (tabla 1.2.65).

Figura 1.2.36.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2023.



* Algo importante o muy importante.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.65.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como "muy importante" la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según sexo (%). España 2012-2023.

		2012	2014	2016	2019	2021	2023
Legalización del cannabis							
Total		37,7	40,3	36,4	34,2	28,4	30,4
Sexo	Hombre	39,3	40,9	36,7	35,7	29,1	30,5
	Mujer	35,9	39,8	36,1	32,8	27,6	30,3
Legalización de todas las drogas							
Total		27,0	29,6	26,8	20,8	17,3	22,7
Sexo	Hombre	25,7	27,5	25,3	20,4	17,3	22,0
	Mujer	28,4	31,8	28,4	21,3	17,2	23,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Cuanto mayor es el nivel de consumo de cannabis, mayor es la presencia de aquellos que consideran que la legalización de esta droga sería muy importante para resolver el problema de las drogas, pasando de 26,6% entre los que no han consumido en el último año hasta un 53,2% entre aquellos con un consumo problemático.

Tabla 1.2.66.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como "muy importante" la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%) España, 2014-2023.

	2014	2016	2019	2021	2023
No han consumido cannabis en el último año	22,6	19,5	18,0	22,7	26,6
Han consumido cannabis en el último año (CAST<4)	45,4	34,9	39,8	45,2	43,1
Han consumido cannabis en el último año (CAST ≥4 Consumo problemático)	58,2	48,2	51,8	63,2	53,2

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Entorno de ocio: actividades, salidas nocturnas (frecuencia y horario) y dinero disponible

Actividades de ocio

Analizando la frecuencia de actividades de ocio realizadas en los últimos 12 meses por los estudiantes, vemos que el 72,2% practica **algún deporte** semanalmente, siendo bastante más frecuente en el grupo masculino (82,5% *vs.* 61,5% entre las chicas).

En el lado opuesto, vemos que únicamente el 22,6% de los alumnos mantiene un **hábito de lectura** semanal, frente a un 38,7% el porcentaje de alumnos que declaran que nunca leen por diversión. En este caso, las chicas manifiestan tener un mayor hábito de lectura semanal que los chicos (30,8% *vs.* 14,5%).

Centrándonos ahora en el ocio nocturno (discotecas, bares, fiestas, cafés...) se observa que el 18,8% de los alumnos sale semanalmente, encontrando una proporción similar en chicos y chicas.

Salir con los amigos por las tardes (de compras, a pasear, al parque a pasar el rato) es muy frecuente, concretamente el 63,9% realizan este tipo de ocio de forma semanal, siendo un comportamiento muy extendido con independencia del sexo.

Por último, uno de cada tres estudiantes indica **tener otro hobby** (toco un instrumento, canto, pinto, escribo…) al que le dedica tiempo de manera semanal. Esta alternativa de ocio es ligeramente más popular en las chicas.

Tabla 1.2.67.

Frecuencia de actividades de ocio realizadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo (%). España, 2023.

		Total	Hombre	Mujer
Practicar algún deporte	Nunca	11,2	6,6	16,0
	Anualmente	5,0	2,9	7,2
	Mensualmente	11,6	8,1	15,3
	Semanalmente	72,2	82,5	61,5
Leer libros por diversión	Nunca	38,7	48,4	28,9
	Anualmente	19,3	20,2	18,4
	Mensualmente	19,4	16,9	21,9
	Semanalmente	22,6	14,5	30,8
Salir con amigos por las tardes	Nunca	4,0	4,8	3,2
	Anualmente	5,0	5,4	4,5
	Mensualmente	27,1	26,6	27,6
	Semanalmente	63,9	63,2	64,7
Salir con amigos por las noches	Nunca	27,2	28,5	25,9
	Anualmente	17,0	16,8	17,3
	Mensualmente	37,0	35,0	39,0
	Semanalmente	18,8	19,7	17,9
Tener otros hobbies	Nunca	42,2	45,7	38,5
	Anualmente	9,2	8,4	9,9
	Mensualmente	15,4	13,4	17,5
	Semanalmente	33,3	32,5	34,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Actividades de ocio y consumo de sustancias psicoactivas

Analizando el consumo de las siguientes sustancias (alcohol, tabaco, cannabis y cocaína) en los últimos 12 meses según las actividades de ocio que han realizado los estudiantes, observamos que los alumnos que salen por la noche de manera frecuente las consumen en mayor medida. De la misma manera esto también sucede entre los que salen habitualmente por las tardes con sus amigos.

Por otro lado, cabe destacar que los estudiantes que no leen libros, cuentan con unas mayores prevalencias de consumo para todas las sustancias anteriormente mencionadas. Lo mismo ocurre para aquellos que no han practicado ningún deporte, donde encontramos mayor presencia de aquellos que han consumido tabaco y cannabis que entre los que sí han practicado alguna actividad física, mientras que los niveles de consumo de alcohol son similares.

Tabla 1.2.68.

Prevalencia de consumo de sustancias de en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según las actividades de ocio realizadas (%). España, 2023.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína polvo y/o base
Ha practicado algún deporte	73,7	26,6	20,9	2,1
No ha practicado ningún deporte	74,2	36,0	27,5	2,9
Ha leído libros para divertirse	69,7	22,9	17,7	1,6
No ha leído libros para divertirse	80,1	34,8	27,6	3,1
Ha salido con amigos por las tardes	75,0	28,4	22,2	2,3
No ha salido con amigos por las tardes	47,5	13,2	11,2	2,4
Ha salido con amigos por las noches	85,7	35,0	27,2	2,8
No ha salido con amigos por las noches	42,0	7,9	6,5	0,8
Tiene otros hobbies	71,4	24,3	19,5	2,0
No tiene otros hobbies	76,9	32,0	24,5	2,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Salidas nocturnas, frecuencia

En ESTUDES también se analiza la frecuencia de las salidas nocturnas y el horario de regreso a casa en dichas salidas para evaluar la posible relación existente entre el consumo de sustancias psicoactivas y el tiempo que se dedica al ocio nocturno.

Con respecto a las salidas nocturnas en los últimos 12 meses (tabla 1.2.69), la frecuencia señalada por un mayor número de alumnos es entre 1 y 3 noches al mes (28,9%), dato muy superior al obtenido en 2021, donde las limitaciones de ocio derivadas de la pandemia COVID-19 hicieron aumentar el número de alumnos que nunca habían salido por la noche, pero que es muy parecido al obtenido en ediciones anteriores.

Los chicos y las chicas salen a divertirse por la noche con una asiduidad similar. Sin embargo, sí vemos que la frecuencia en las salidas aumenta a medida que lo hace la edad, de forma que aproximadamente 3 de cada 4 jóvenes de entre 17 y 18 años salen de 1 a 3 noches al mes (tabla 1.2.70).

Salidas nocturnas, frecuencia y consumo de sustancias psicoactivas

Al poner en relación el patrón de salidas nocturnas con el consumo de las drogas de mayor prevalencia (alcohol, tabaco, cannabis, cocaína) se observa que la extensión del consumo aumenta conforme lo hace la frecuencia de las salidas (tabla 1.2.71).

El 33,1% de los alumnos que no han salido en los últimos 12 meses han tomado bebidas alcohólicas. Esta proporción se duplica entre los que han salido esporádicamente (67,3%), y se hace mayoritaria entre los que han salido al menos 1 noche al mes (82,8% entre los que han salido de 1 a 3 noches y 90,7% entre los que han salido 3-4 noches a la semana).

Tabla 1.2.69.

Frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2023.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Nunca	11,8	10,7	11,8	7,2	8,7	8,7	10,1	25,3	13,0
Menos de una noche al mes	11,7	11,0	12,7	15,1	17,7	17,6	19,6	17,5	18,9
De 1 a 3 noches al mes	23,6	22,1	26,2	28,8	30,1	28,7	30,3	18,3	28,9
1 noche a la semana	18,5	17,3	18,4	17,9	17,0	17,2	16,1	11,5	14,5
2 noches a la semana	24,5	26,7	22,1	19,9	18,6	19,3	16,8	16,2	16,8
3-4 noches a la semana	5,9	6,8	4,7	4,8	4,7	5,2	4,2	6,5	4,8
Más de 4 noches a la semana	3,9	5,3	3,6	3,2	3,3	3,3	2,9	4,8	3,2



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.70.

Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad (%). España, 2023.

	TOTAL	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Nunca	13,0	13,3	12,8	21,9	16,0	10,4	7,8	8,3
Menos de una noche al mes	18,9	18,9	18,8	21,2	20,0	17,7	18,1	15,8
De 1 a 3 noches al mes	28,9	27,4	30,5	24,0	27,1	30,3	32,3	30,9
1 noche a la semana	14,5	15,0	13,9	11,8	12,6	15,4	16,3	17,5
2 noches a la semana	16,8	16,8	16,8	14,4	16,6	17,6	17,5	17,9
3-4 noches a la semana	4,8	5,1	4,4	3,8	4,5	5,0	5,0	6,5
Más de 4 noches a la semana	3,2	3,6	2,7	3,0	3,1	3,5	3,0	3,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.71.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína polvo y/o base
Nunca	33,1	5,3	4,8	0,5
Menos de una noche al mes	67,3	16,4	12,6	1,3
De 1 a 3 noches al mes	82,8	29,9	23,9	1,5
1 noche a la semana	85,8	35,0	27,4	2,6
2 noches a la semana	89,6	44,3	33,1	3,4
3-4 noches a la semana	90,7	50,2	40,3	7,7
Más de 4 noches a la semana	90,1	55,1	44,2	11,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En relación con el consumo de tabaco, el 16,4% de los estudiantes que salieron esporádicamente (menos de una noche al mes) reconocen haber fumado en este periodo, duplicándose entre los que salen semanalmente (35,0%) y elevándose hasta el 55,1% entre los que salen más de 4 noches a la semana.

Por su parte, el cannabis tiene una presencia inferior al 5% entre los adolescentes que no han salido por la noche en el último año, pero alcanza una prevalencia superior al 25% entre los que tienen un hábito de salidas semanal, llegando a alcanzar una prevalencia del 44,2% entre los que salen más de 4 noches a la semana.

Se contempla el mismo escenario a la hora de abordar el consumo de cocaína, que registra una prevalencia residual entre los estudiantes que salen menos de una noche a la semana y alcanza el máximo valor entre aquellos que salen más de 4 noches a la semana (11,3%).

Si se analiza la extensión del consumo de **drogas ilegales** (en los últimos 12 meses) junto con la frecuencia de las salidas nocturnas, resulta evidente que el consumo se encuentra más extendido entre los adolescentes que salen por la noche con mayor frecuencia (figura 1.2.37).

Figura 1.2.37.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2023.



* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Salidas nocturnas, horario de regreso a casa

La encuesta ESTUDES incluye también preguntas sobre la hora de regreso a casa durante la última salida por la noche, en fin de semana por diversión, en los últimos 12 meses (tabla 1.2.72).

Considerando a los estudiantes que en los últimos 12 meses salieron a divertirse por la noche, el 40,1% regresó a casa antes de la 1 de la madrugada en su última salida en fin de semana, el 33,9% volvió entre la 1 y las 4 de la mañana mientras que el 26,1% regresó más tarde de las 4 de la madrugada.

Tabla 1.2.72.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas (%). España, 2006-2023.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Antes de las 12 de la noche	16,1	14,5	16,5	14,6	17,1	20,2	19,3	54,2	23,2
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	15,1	15,7	16,4	14,0	17,1	18,0	16,5	12,7	16,9
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	13,9	13,8	13,8	11,3	12,7	12,5	11,3	7,1	11,5
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	13,8	14,6	13,0	11,4	12,3	12,0	11,1	5,9	10,9
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	15,3	15,3	15,6	14,9	14,0	12,7	13,5	5,4	11,5
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	20,6	20,3	19,6	25,2	21,0	19,0	22,2	7,3	20,4
Después de las 8 de la mañana	5,2	5,9	5,1	8,6	5,8	5,6	6,2	7,3	5,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Con respecto a 2021, se ha incrementado de manera notable el número de alumnos que regresan a sus casas después de las 12 de la noche, debido al contexto sanitario vivido durante 2020-2021 que también condicionó los horarios de regreso a casa ya que, como medida restrictiva se implantaron “toques de queda” durante determinados meses. Respecto a 2019 se registra un patrón de comportamiento más parecido con una ligera menor presencia de estudiantes que han llegado a casa más tarde de la 1 de la madrugada (figura 1.2.38).

Salidas nocturnas, horario de regreso a casa y consumo de sustancias psicoactivas

Por otro lado, atendiendo a la prevalencia de consumo de las sustancias psicoactivas más extendidas (alcohol, tabaco, cannabis y cocaína), se observa que cuanto más tiempo se dedica al ocio nocturno, mayor es el consumo.

El consumo de **alcohol** se encuentra generalizado entre los estudiantes que en su última salida regresaron a partir de la 1 de la madrugada: la prevalencia del alcohol se sitúa entre el 80% y el 90% en el grupo que regresó entre la 1 y las 3 de la madrugada, mientras que los estudiantes que volvieron más tarde de las 3 de la madrugada registran una prevalencia superior al 90% (tabla 1.2.73).

Por su parte, el consumo de **tabaco** y de **cannabis** repunta especialmente cuando se observa el colectivo que volvió a partir de las 4 de la mañana en su última salida. En el caso de la cocaína, el incremento más notorio se obtiene al considerar el colectivo que regresó más tarde de las 8 de la mañana.

Figura 1.2.38.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según el horario de regreso a casa en los últimos 12 meses (%). España, 2006-2023.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Antes de las 12 de la noche	16,1	14,5	16,5	14,6	17,1	20,2	19,3	54,2	23,2
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	15,1	15,7	16,4	14,0	17,1	18,0	16,5	12,7	16,9
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	13,9	13,8	13,8	11,3	12,7	12,5	11,3	7,1	11,5
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	13,8	14,6	13,0	11,4	12,3	12,0	11,1	5,9	10,9
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	15,3	15,3	15,6	14,9	14,0	12,7	13,5	5,4	11,5
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	20,6	20,3	19,6	25,2	21,0	19,0	22,2	7,3	20,4
Después de las 8 de la mañana	5,2	5,9	5,1	8,6	5,8	5,6	6,2	7,3	5,7

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 1.2.73.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2023.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína polvo y/o base
No ha salido	35,3	6,0	5,5	0,7
Antes de las 12 de la noche	55,8	13,3	9,3	0,8
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	74,8	19,8	14,3	1,2
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	80,9	27,1	20,0	2,2
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	87,2	33,5	25,4	2,2
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	91,4	37,4	28,8	2,0
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	95,9	49,9	40,7	3,8
Después de las 8 de la mañana	94,0	61,4	53,8	11,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Dinero disponible para gastos personales

Los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años disponen, por término medio, de 15,6 euros a la semana para sus gastos personales.

De media, los chicos cuentan con una mayor cantidad de dinero que las chicas (1,4 euros de media más a la semana) y, en términos de edad, el dinero disponible se incrementa conforme aumenta la edad de los estudiantes, registrándose la mayor cantidad semanal entre los de 17 a 18 años (figura 1.2.39).

Figura 1.2.39.

Dinero disponible (euros) por término medio a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad. España, 2023.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Situación económica familiar

El 82,2% de los estudiantes de 14 a 18 años opina que la situación económica de su familia es más o menos igual que la de la media. El 13,2% opina que está por encima de la media y solamente un 4,6% piensa que la situación económica de su familia es peor que la media.

Si analizamos la situación económica de las familias según el consumo de los alumnos, observamos que no se aprecian diferencias notables cuando atendemos a los consumidores de las sustancias más prevalentes; sin embargo, entre los consumidores habituales de cocaína encontramos unos porcentajes más altos de alumnos que manifiestan que la situación económica de sus familias se encuentra por encima (18,2%) y por debajo (10,6%) de la media nacional.

Tabla 1.2.74.

Situación económica de la familia entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias en los últimos 30 días. España, 2023.

	Total estudiantes (14-18 años)	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína
Por encima de la media	13,2	14,2	14,8	15,7	18,2
Más o menos como la media	82,2	81,2	78,7	77,6	71,2
Por debajo de la media	4,6	4,5	6,5	6,7	10,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Consecuencias no deseables del consumo de drogas

A continuación, se muestra una tabla que recoge algunas situaciones indeseables que han vivido los alumnos en el último año según hayan consumido alguna sustancia psicoactiva: Conflicto importante con padres o hermanos, incapacidad de recordar lo sucedido la noche anterior después de haber salido, tener dificultad para concentrarse en clase al día siguiente después de salir, ser expulsado del centro educativo durante un día completo o más, tener resaca, haber tenido relaciones sexuales de las que se han arrepentido al día siguiente, haber tenido relaciones sexuales sin preservativo, haber sufrido un brote psicótico (alucinaciones, delirios…), haber sufrido un ataque de ansiedad o haber sufrido *bullying.*

Tabla 1.2.75.

Prevalencia de experimentar ciertas situaciones en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (%). España, 2023.

	Discusión	No recordar	No concentrarme	Expulsado	Resaca	Arrepentimiento de relaciones sexuales	Relaciones sexuales sin preservativo	Brote psicótico	Ansiedad	Bullying
TOTAL ALUMNOS	40,4	20,3	18,2	6,9	34,9	7,5	16,9	3,7	33,7	10,5
Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	46,2	32,0	26,0	9,0	55,5	11,1	24,8	4,9	37,9	10,3
No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	32,8	5,2	8,0	4,3	8,7	3,0	6,7	2,1	28,4	10,7
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	50,5	51,5	35,5	11,3	76,5	16,5	35,0	7,1	41,8	9,0
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	37,7	12,0	13,5	5,7	23,8	5,1	12,1	2,8	31,6	10,8
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	49,4	44,4	33,0	11,4	69,3	15,2	32,1	6,4	39,6	10,1
No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	36,7	10,8	12,2	5,0	21,4	4,4	10,8	2,5	31,4	10,6
Ha hecho botellón en los últimos 30 días	49,9	45,7	33,7	11,3	69,8	15,3	31,1	6,7	39,5	9,0
No ha hecho botellón en los últimos 30 días	38,1	14,2	14,3	5,7	26,5	5,6	13,4	2,9	32,5	10,7
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	59,0	48,7	41,1	21,8	73,7	26,3	53,6	12,8	53,4	13,2
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	38,9	18,0	16,3	5,7	31,7	6,0	13,9	2,9	32,1	10,2
Ha consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	63,2	31,5	33,3	12,2	48,6	17,0	32,2	14,7	70,7	24,6
No han consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	38,3	19,4	16,7	6,4	33,7	6,7	15,6	2,7	30,4	9,1
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días	53,8	44,1	35,1	16,4	65,5	20,3	41,0	10,4	43,5	12,0
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días	38,0	16,1	15,1	5,2	29,4	5,2	12,6	2,4	32,0	10,2
Consumo problemático de cannabis (CAST>=4)	68,0	61,1	57,6	35,0	73,7	40,8	64,0	29,3	56,1	19,2
Consumo de cannabis (CAST<4) y no consumidores de cannabis	39,7	19,4	17,2	6,3	33,9	6,8	15,8	3,1	33,2	10,3
Ha consumido cocaína en los últimos 12 meses	58,1	54,3	49,7	29,8	65,3	35,2	57,0	27,0	48,5	21,1
No ha consumido cocaína en los últimos 12 meses	39,9	19,6	17,4	6,3	34,2	6,9	16,0	3,1	33,3	10,2

Discusión: Conflicto importante con padres o hermanos; No recordar: La incapacidad de recordar lo sucedido la noche anterior después de haber salido; No concentrarme: Tener dificultad para concentrarse en el colegio al día siguiente después de salir; Expulsado: Ser expulsado del centro educativo durante un día completo o más; Resaca: tener resaca; Arrepentimiento de relaciones sexuales: haber tenido relaciones sexuales de las que se han arrepentido al día siguiente; Relaciones sexuales sin preservativo: haber tenido relaciones sexuales sin preservativo; Brote psicótico: haber sufrido un brote psicótico (alucinaciones, delirios…); Ansiedad: haber sufrido un ataque de ansiedad; Bullying: Haber sufrido bullying (acoso) a través de internet o por otros medios (acoso directo o indirecto físico, verbal, psicológico, sexual o social).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En términos generales, el 40,4% de los estudiantes de 14 a 18 años afirma haber tenido algún **conflicto o discusión** importante con padres o hermanos, cifra muy semejante a la obtenida en 2021 (40,6%). Este porcentaje aumenta considerablemente entre los consumidores de todas las sustancias analizadas, logrando el mayor porcentaje entre los consumidores problemáticos de cannabis, donde este dato supone el 68%.

El 20,3% de los alumnos declara haber tenido **problemas para recordar** lo sucedido la noche anterior tras haber salido algún día del último año (17,9% en 2021). Esta circunstancia crece de forma notable cuando los jóvenes se han emborrachado recientemente (51,5%), han tomado cocaína en el último año (54,3%) o han realizado un consumo problemático de cannabis (CAST ≥4) (61,1%).

El 18,2% de los estudiantes de 14 a 18 años afirma que ha tenido **dificultad para concentrarse** en clase al día siguiente después de salir (17,2% en 2021). Esta falta de concentración aumenta entre los que consumen tabaco a diario (41,1%), entre los que han tomado cocaína en el último año (49,7%) o han realizado un consumo problemático de cannabis (CAST ≥4) (57,6%).

Respecto a la **resaca** producida por el consumo de alcohol, el 34,9% (31,4% en 2021) de los alumnos afirma haber sufrido esta experiencia, aunque esta proporción asciende hasta un 76,5%, un 69,3% y un 69,8% entre los que se han emborrachado, los que han hecho *binge drinking* y los que han participado en un botellón respectivamente, en los últimos 30 días.

En cuanto a las **relaciones sexuales sin preservativo**, el porcentaje de estudiantes que reconoce haberlas tenido es del 16,9% (16,3% en 2021), incrementándose de manera importante entre los consumidores de todas las sustancias psicoactivas, destacando los consumidores problemáticos de cannabis y los consumidores de cocaína, entre los cuales las prevalencias de haber tenido relaciones sexuales sin protección están próximas al 60%.

El 3,7% de los estudiantes de 14 a 18 años han sufrido algún **brote psicótico** en los últimos 12 meses, cifra que se multiplica por 8 en los consumidores problemáticos de cannabis hasta alcanzar el 29,3%.

El 33,7% de los estudiantes de 14 a 18 años ha sufrido **ansiedad**, resultando mayor entre aquellos que han consumido hipnosedantes en el último mes (70,7%).

Para finalizar, el porcentaje de alumnos que han sufrido ***bullying*** (acoso) a través de internet o por otros medios es del 10,5% (10,7% en 2021), resultando mayor entre aquellos que han consumido hipnosedantes en el último mes (24,6%).